

دستورالعمل مراقبت منزليت

Guideline of Meningitis surveillance

تأليف و تدوين :

دكتور عبدالرضا استقامتى

دكتور فرشته عسگري

نعمت ا... گودرزى

با همکاری : دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسرکشور

زير نظر :

دكتور محمدمهدى گويا

دكتور سيد محسن زهراي

مرکز مدیریت بیماریها

اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه‌ها

چاپ سوم

۱۳۸۴ پايز

فهرست مطالب

| <u>صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------|---|
| ۱ | پیشگفتار |
| ۲ | مقدمه |
| ۳ | منزیت باکتریال |
| ۴ | کلیات |
| ۵ | منزیت باکتریال در منطقه مدیرانه شرقی |
| ۶ | منزیت هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b |
| ۷ | منزیت منگوکوکی |
| ۸ | منزیت پنوموکوکی |
| ۹ | عوامل ایجاد گننده منزیت باکتریال |
| ۱۰ | هموفیلوس آنفلوانزا |
| ۱۱ | نیسیریا منزیتیدیس |
| ۱۲ | استرپتوکوکوس پنومونیه |
| ۱۳ | پروفیلاکسی |
| ۱۴ | کمو پروفیلاکسی |
| ۱۵ | ایمنوپروفیلاکسی |
| ۱۶ | برنامه مراقبت منزیت در ایران |

نظام مراقبت

| | |
|----|--|
| ۱۹ | اهداف کلی و اختصاصی |
| ۱۹ | اهداف مراقبت آزمایشگاهی منژیت باکتریال |
| ۲۰ | اصول نظام مراقبت منژیت باکتریال |
| ۲۱ | اطلاعات مورد نیاز |
| ۲۱ | اطلاعات قابل گزارش |
| ۲۳ | انواع سیستم مراقبت |
| ۲۳ | مراقبت ملی مبتنی بر جمعیت |
| ۲۴ | مراقبت مبتنی بر جمعیت در مناطق منتخب |
| ۲۵ | مراقبت منطقه‌ای مبتنی بر آزمایشگاه |

تشخیص منژیت باکتریال

| | |
|----|---------------------------|
| ۲۷ | تعاریف و تقسیم‌بندی موارد |
|----|---------------------------|

مفهوم‌های مود توجه در بروخود بالینی با بیمار مظنون به منژیت

| | |
|----|---|
| ۲۸ | جمع‌آوری و ارسال نمونه |
| ۲۹ | روش انجام LP (تهیه نمونه مایع مغزی نخاعی؟) احتیاطات لازم در تهیه نمونه خون |
| | وظایيف فرد هماهنگ کننده مراقبت در مرکز ارائه خدمت |
| ۳۴ | روشهای آزمایشگاهی بررسی نمونه |
| ۳۵ | ثبت و جمع آوری اطلاعات - سیستم گزارش‌دهی |

مراقبت در اپیدمی‌ها

| | |
|----|-------------------------------------|
| ۳۸ | تعريف اپیدمی بیماری مننگوکوکی |
| ۴۱ | کشف و تأیید اپیدمی بیماری مننگوکوکی |
| ۴۱ | نحوه برخورد با اپیدمی‌ها |

ضدیمه

| | |
|-------|---|
| ۵۴ | شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کیفیت مراقبت منژیت |
| ۵۹-۶۳ | فرم شماره <u>۱</u> تکمیل اطلاعات بیماران و دستور العمل تکمیل آن |
| ۶۴-۷۶ | فرم شماره <u>۲</u> تکمیل اطلاعات بیماران و دستور العمل تکمیل آن |
| ۶۸-۷۰ | فرم شماره <u>۳</u> تکمیل اطلاعات بیماران و دستور العمل تکمیل آن |
| ۷۱ | گردش کار برنامه کشوری مراقبت منژیت |
| ۷۲ | منابع |

پیشگفتار:

مدیریت سلامت در زمینه کنترل بیماریها، نیازمند جمع آوری اطلاعات صحیح، مستمر و به موقع است و این امر جز با داشتن نظام مراقبت قوی و کار آمد که بتواند داده‌های مربوط به بیماری مورد نظر را از منابع گزارش دهنده جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و نتایج آن را در اسرع وقت منتشر و به اطلاع مدیران و گروههای نیازمند به این اطلاعات برساند، میسر نمی‌گردد.

یکی از بیماریهاییکه قابلیت بالای اپیدمی داشته و با درصد بالای مرگ و میر همراه است بیماری منژیت بوده که نیازمند نظام مراقبت است تا بار حاصل از مرگ و میر و ناتوانی این بیماری را با مدیریت توانمند به حداقل برساند . مراقبت از این بیماری طی دو دهه گذشته متناسب با وضعیت سلامت در هر دوره زمانی، دستخوش تحولاتی گردیده است . امروزه با کسب تجارت گذشتگان و نیازهای جدید بهداشتی، مراقبت این بیماری نیز فراتر از قبل، ارتقاء یافته تا بتواند به بهترین شکل پاسخگوی اهداف سلامتی و بهداشت در هزاره جدید باشد. مجموعه حاضر که حاصل تلاش همکارانم در مرکز مدیریت بیماریها و دانشگاههای علوم پزشکی می‌باشد سعی نموده راهنمای پیشگیری و تشخیص این بیماری را به صورت کاملاً علمی و قابل اجرا در بخش‌های بهداشت و درمان فراهم نماید. امید است که با مدنظر قرار دادن این مجموعه و توصیه‌های آن در مسیر تعالی سلامت جامعه گامی استوارتر برداشته و در تحقق آن کوشایم.

دکتر محمد اسماعیل اکبری
معاون سلامت

مقدمه

بیماری منژیت از جمله بیماریهایی است که از میزان مرگ و میر و عوارض نسبتاً بالایی برخوردار است. از آنجاییکه زمان ابتلا به بیماری اغلب در دو ران کودکی است، نه تنها عوارض بیماری و معلولیتهای ناشی از آن افراد مبتلا را سالیان متدامی درگیر می نماید، بلکه عواقب اقتصادی و اجتماعی نامطلوب آن جامعه را نیز متاثر می سازد. به علاوه از خصوصیات قابل توجه منژیت، قابلیت ایجاد اپیدمی توسط سوش خاصی از ارگانیسم مولد بیماری است که کنترل آن تنها با بنا نهادن یک نظام مراقبت پویا و دقیق و گزارش دهی به هنگام و سریع امکان پذیر می گردد.

مرگ و میر و عوارض نسبتاً شدید بیماری منژیت، تحمل هزینه های گزارف درمان، معلولیتهای ناشی از بیماری، اشغال تختهای بیمارستانی و در نه ایت اهمیت کنترل بیماری در شرایط اپیدمی و حتی بروز موارد نک گیر، ما را بر آن داشته است که با مراقبت از این بیماری خطرناک از عواقب نامطلوب آن پیشگیری نمائیم.

مشکلاتی نظیر عدم توانایی آزمایشگاه ها در جداسازی پاتوژن مولد منژیت و عدم ارسال گزارش به هنگام، موثق و دقیق از سطوح محیطی به میانی و مرکزی از جمله مواردی است که مراقبت این بیماری را با مشکل مواجه می سازد.

(

rettaecap

در حال حاضر توجه سازمان جهانی بهداشت به مراقبت از بیماری منژیت در کودکان زیر پنج سال معطوف شده است و طبعاً عفونت با ارگانیسم هموفیلوس آنفلوانزا - که بیشترین درصد ابتلا این کودکان را در کشورهای در حال توسعه، تشکیل می دهد- دارای اهمیت زیادی است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در کشورهایی که طی سالهای گذشته در قالب طرح واکسیناسیون ملی، اقدام به واکسیناسیون برعلیه ارگانیسم هموفیلوس آنفلو انزا در کودکان نموده اند، پس از گذشت چند سال، در میزان ابتلای کودکان در معرض خطر به این ارگانیسم، افت شدیدی به وجود آمده است.

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از موارد منژیت توسط عوامل ویروسی و باکتریال ایجاد می‌شوند، مراقبت بیماری منژیت شامل پیشگیری از اپیدمی‌ها و ممانعت از شیوع و گسترش این دو عامل عمدۀ خواهد بود.

اغلب منژیتهای ویروسی شدت کمتری دارند و بدون درمان خاصی بهبود می‌یابند؛ درحالیکه منژیت باکتریال، شدیدتر است و می‌تواند مشکلاتی مانند صدمات مغزی، ناشنوایی و اختلالات یادگیری را ایجاد نماید.

نکته مهم در منژیتهای باکتریال، تشخیص نوع باکتری ایجاد کننده منژیت است زیرا در مورد هر باکتری، نحوه مقابله با آن و تعیین نوع آنتیبیوتیک برای پیشگیری از بیماری و کنترل گسترش آن در جامعه، متفاوت است.

انتظار می‌رود که پس از ارزیابی وضعیت م وجود با تقویت و توانمندسازی آزمایشگاهها برای تشخیص ارگانیسم‌های به وجود آورنده بیماری منژیت ، اقدامات و فعالیتهای پیشگیرانه فراگیرتری در خصوص این بیماری به همت همکاران عزیز در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با نظرارت این مرکز انجام گردد.

منزیت باکتریال^۱

کلیات :

منزیت باکتریال یکی از نگران کننده‌ترین بیماریهای عفونی کودکان است که اپیدمی آن می‌تواند همه جمعیت را متاثر سازد . استرپتوكوک پنومونیه ^۲، هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b ^۳ و نیسیریامنزیتیدیس ^۴ انیلوژی‌های عمدۀ منزیت باکتریال بعد از دوران نوزادی به شمار می‌روند و با مرگ و میر و عوارض شدیدی همراه هستند.

همچنین هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b، استرپتوكوک پنومونیه از شایع ترین علل پنومونی حاد باکتریال نیز می‌باشد که خود از جمله علل عمدۀ مرگ کودکان در کشورهای در حال توسعه است.

تعداد موارد ابتلاء به منزیت در دنیا سالیانه ۱/۲ میلیون نفر و مرگ ناشی از آن ۱۳۵/۰۰۰ نفر برآورد می‌شود.

نیسیریامنزیتیدیس (N.m) براساس آنتیژن پلی ساکاریدی خود چندین سروگروپ مختلف دارد که عبارتند از A , Z , Y , X , C , B , A . W۱۳۵ ، ۲۹ - E

سروغروپ A (منگوکوک)، علت اصلی اپیدمی بیماری منگوکوک است و تاکنون در آفریقا، هم در طی اپیدمی و هم به صورت بومی در فواصل بین اپیدمیها، عامل ایجاد کننده غالب بوده است. بیشترین موارد و بار بیماری در منطقه "زیر صحرا آفریقا"^۵ در ناحیه‌ای بین سنگال و اتیوپی، موسوم به "کمریند منزیت"، اتفاق می‌افتد.

اپیدمیها به طور نامنظم هر ۱۲ - ۵ سال، اتفاق می‌افتد. وسعت این اپیدمیها، می‌تواند در حدود ۸۰۰ - ۴۰۰ مورد ابتلاء در صد هزار متغیر باشد . در سال ۱۹۹۶ به دنبال اپیدمی منزیت منگوکوکی با سروگروپ A در منطقه زیر صحرا آفریقا، حدود ۲۰۰/۰۰۰ مورد بیماری، گزارش شد که با ۲۰ هزار مرگ همراه بود.

۱) Bacterial meningitis

۲) Streptococcus Pnmonia

۳) Haemophilus Influenzae Type b Hib

۴) Neisseria Meningitidis

۵) Sub Saharan Africa

سروگروپ B و C، گاهی باعث ایجاد طغیان (Out Break) شده و سروگروپ W ۱۳۵ نیز اخیراً با بروز Out Break در مدت زمان برگزاری حج در عربستان سعودی، همراه بوده است. در شرایط غیراپیدمیک بیماری مننگوکوک در بچه‌های سنین قبل از مدرسه شایع‌تر است (۵۰ تا ۶۰ درصد موارد در کودکان ۳ ماه تا ۵ سال، اتفاق می‌افتد)، اما در سنین پیش‌دبستانی، نوجوانان و بالغین جوان بین ۳۰ - ۲۵ سال نیز دیده می‌شود. جوانانی که در اجتماعات و محیط‌های بسته زندگی می‌کنند (مثل مدارس و امدادگران در ارتش و سپاه) بیشتر از دیگران متاثر می‌شوند. تماس نزدیک در خانه با بیماران مبتلا به بیماری مننگوکوک، خطر ابتلاء به بیماری اکتسابی در جمعیت عمومی را تقریباً ۵۰۰ تا ۸۰۰ برابر (بسته به سن) افزایش می‌دهد.

Hib به عنوان یکی از علل منژیت و پنومونی باکتریال در کودکان کمتر از ۵ سال، شناخته شده است. ۹۰٪ بیماران مبتلا به منژیت Hib، زیر ۵ سال سن دارند (پیک سنی ابتلاء ۶ تا ۱۱ ماهگی است). Hib با مرگ و میر و عوارض قابل توجهی همراه است. عوارض بیماری، تقریباً در ۳۰ تا ۱۰ درصد از بیماران دیده می‌شود و میزان مرگ و میر در موارد منژیت Hib، تقریباً ۳ تا ۵ درصد است. در مجموع تخمین زده می‌شود که Hib حداقل عامل ۳ میلیون مورد بیماری شدیح است و همچنین سالانه باعث مرگ حدود ۴۰۰/۰۰۰ تا ۷۰۰/۰۰۰ کودک در سراسر دنیا می‌شود. در سالهای گذشته، پیشرفت در تولید واکسن کونژوگه جدید منجر به کاهش عفونت و مرگ به علت Hib شده و اثربخشی واکسن جدید در ابتدای دوران کودکی، حذف عفونت و مرگ ناشی از آن را امکان‌پذیر ساخته است. واکسن کونژوگه Hib که در جدول روئین واکسیناسیون کودکان در ۶۰ کشور، ادغام شده، بخشی از برنامه ایمن‌سازی کودکان را به خود اختصاص داده است و به علت اثربخشی عالی این واکسنها، منژیت Hib در این مناطق تقریباً حذف گردیده است.

بروز سالیانه منژیت ناشی از استرپتوکوک پنومونیه در اغلب کشورها، بین ۱-۲ مورد در صد هزار نفر است اما کشورهای در حال توسعه، از میزان بروز بیشتری (تا ۲۰ مورد درصد هزار) برخوردارند. بیشترین میزان بروز این بیماری در کودکان زیر دو سال دیده شده است. هر چند در گروه بالغین جوان، بروز بیماری کاهش یافته است، اما در سنین بالاتر، افزایش مجدد آن مشاهده می‌شود. میزان بروز این بیماری در فصل سرما (نسبت به فصل گرما) و در آب و هوای

معتل، بیشتر بوده و میزان مرگ ناشی از منژیت پنوموکوکی، چندین برابر انواع مننگوکوکی یا Hib است. بیش از نیمی از موارد منژیت پنوموکوکی، حداقل یک عارضه دارند. تاکنون، درمان آنتیبیوتیکی موارد مبتلا شده و در بعضی مواقع کمپروفیلاکسی هنگام تماس، تنها راه کنترل منژیت بوده است . در حال حاضر برای پیشگیری از علل عمدۀ منژیت باکتریال (Hib,N.m,S.p)، واکسن‌های مؤثر و مناسبی در دسترس می باشد. پیشرفت در مراقبت منژیت باکتریال، می تواند توجه پزشکان و دیگر کارمندان بهداشتی و تصمیم‌گیرنده‌ها را به سمت Hib به عنوان یکی از علل مهم مرگ و میر و ابتلاء در کشور، معطوف دارد . اگر چه مرگ‌های ناشی از Hib و استرپتوکوک پنومونیه بیشتر در اثر پنومونی است تا منژیت، اما انجام مراقبت پنومونی به اندازه‌ای مشکل است که به طور روตین امکان پذیر نیست و بنابراین مراقبت منژیت ناشی از آنها یکی از بهترین روش‌ها برای اندازه گیری اثر بخشی برنامه واکسیناسیون برعلیه Hib و S.p بوده و از نظر تشخیص زودرس اپیدمی بیماری مننگوکوکی و تنظیم پاسخ مناسب به آن نیز، اهمیت دارد.

مننژیت باکتریال در منطقه مدیترانه شرقی:

مننژیت هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b (Hib) در ناحیه مدیترانه شرقی:

اطلاعات مربوط به بار بیماری Hib در مدیترانه شرقی (EMRO) از طریق منابع متون پژوهشی، مطالعات انجام شده در کشورها، مراقبت مبتنی بر جمعیت^۱ و با استفاده از امکانات و تسهیلات ارزیابی سریع (RAT)^۲ به وسیله WHO قابل دستیابی است. بر اساس چندین مطالعه صورت گرفته، Hib از علل اصلی مننژیت باکتریال در کودکان است.

۱. Population based surveillance

۲. Rapid Assessment tools

جدول ۱: مطالعات انجام شده در مورد علل مننژیتهاي باکتریال در بین کودکان

چند کشور، در سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱

| علت بیماری (تعداد موارد به درصد) | | | | | کل موارد | سن (سال) | مطالعه (سال) |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|--|
| ساير موارد | نیسیریا مننژیتیدیس | استرپتوکوک پنومونیه | هموفیلوس آنفلوآنزا | | | | |
| (٪۲۱)۲۴ | (٪۱۳)۱۴ | (٪۲۱) ۲۳ | (٪۴۵)۴۹ | ۱۱۰ | ۰ - ۱۲ | | کویت (۱۹۸۱-۱۹۸۷) |
| (٪۱۵)۸ | (٪۰۴) ۲ | (٪۳۵)۱۹ | (٪۴۷)۲۶ | ۵۵ | ۰ - ۱۰ | | KSA (۱۹۸۲-۱۹۹۰) عربستان سعودی |
| ۱۴ | ۰ | (٪۳۳)۲۰ | (٪۴۳)۲۶ | ۶۰ | ۰ - ۱۰ | | لیبی (۱۹۹۴) |
| (٪۲۰)۲۴ | (٪۰۳۳) ۴۰ | (٪۱۵)۱۸ | (٪۳۲)۳۹ | ۱۲۱ | ۰ - ۱۲ | | اردن (۱۹۹۵) |
| (٪۱۸)۴۱ | (٪۰۱۳) ۳۰ | (٪۳۰)۶۸ | (٪۳۹)۸۹ | ۲۲۸ | ۰ - ۵ | | مصر (۱۹۹۸-۲۰۰۱) |

سازمان بهداشت جهانی، با توجه به اطلاعات حاصل از مطالعات بار بیماری و گزارش پوشش واکسیناسیون Hib، تعداد مبتلایان به مننژیت Hib را در منطقه مدیترانه شرقی، سالیانه ۱۵۸۷۸ نفر (۱۲/۶٪ کل موارد) و مرگ ناشی از آن را ۶۷۹۶ مورد، تخمین می‌زند.

با استفاده از این اطلاعات و با در نظر گرفتن بروز حداقل ۵ مورد پنومونی Hib در مقابل یک مورد مننژیت Hib، موارد مرگ کودکان زیر ۵ سال منطقه مدیترانه شرقی دراژر Hib، حدوداً ۴۰/۰۰۰ مورد در سال، برآورد می‌شود.

کشورهای یمن، لیبی، مصر و مراکش در حال برنامه ریزی برای انجام آن واکسیناسیون Hib در سال ۲۰۰۵ هستند.

جدول ۲ - بروز مننژیت Hib در کشورهای منطقه شرق مدیترانه‌ای

WHO

| کشور | میزان بروز مننژیت Hib (در ۱۰۰/۰۰۰ کودک زیر ۵ سال) |
|-------------------|---|
| سودان | (۲۰۰۳) ۵۷/۵ RAT ژانویه (۲۰۰۰) |
| لیبی | (۲۰۰۳) ۳۵/۳ RAT اکتبر (۲۰۰۴) تا ۴۲/۴ |
| مصر | (۲۰۰۲) ۱۸/۵ RAT جولای (۲۰۰۹) تا ۵۹/۹ |
| عمان | (۲۰۰۰) ۲۳/۵ RAT ژوئن (۲۰۰۱) تا ۴۱/۲ |
| تونس | (۲۰۰۱) ۳۲/۹ (مراقبت مبتنی بر جمعیت) RAT نوامبر (۲۰۰۰) |
| یمن | (۲۰۰۰) ۲۳ RAT (نومبر ۲۰۰۰) |
| مراکش | (۲۰۰۲) ۲۳ RAT (ژوئن ۲۰۰۰) |
| امارات متحده عربی | (۲۰۰۱) ۱۹ تا ۲۲ (مطالعه منتشر شده) |
| بحرين | (مطالعه منتشر شده) ۲۱ |
| عربستان سعودی | (۲۰۰۱) ۱۶/۹ (مراقبت مبتنی بر جمعیت) |
| پاکستان | (۲۰۰۳) ۱۶/۳ MAR (۲۰۰۳) RAT مارس |
| قطر | (مطالعه منتشر شده) ۱۶ |
| اردن | (مطالعه منتشر شده) ۱۵ |

| | |
|---------|--------------------------------|
| کویت | (مطالعه منتشر شده) ۱۵ |
| * ایران | ۵ تا ۳/۵ (۴/۷ RAT) نوامبر ۲۰۰۰ |

جدول شماره ۲ اطلاعات بروز بار بیماری را در مدیترانه‌شرقی براساس منبع آن، گزارش می‌کند. واکسن Hib، اثر بخشی بسیار مناسبی دارد ولی تنها در ۱۱ کشور مدیترانه‌شرقی (که ۱۲/۶٪ از کل کودکان منطقه را در بر می‌گیرد) در برنامه جاری واکسیناسیون به کار می‌رود.

* مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۰، علت پائین بودن میزان منتشریت Hib را به کارگیری روش نامناسب آزمایشگاهی، دانسته، و برآورد دقیق آن اکنون در حال بررسی مجدد است.

منتزیت مننگوکوکی در منطقه مدیترانه شرقی :

منتزیت مننگوکوکی، در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی ب خصوص کشورهای نزدیک کمربند منتزیت آندمیک بوده و طفیانه‌ای ناگهانی آن نیز گاهی در ابعاد کوچک رخ می‌دهد. اطلاعات گزارش شده، بروز سالانه منتزیت مننگوکوکی را در منطقه مدیترانه شرقی متفاوت و بین یک تا ۵ در صدهزار نفر نشان می‌دهد. البته در این مورد، باید خطف نظام های مراقبت بعضی کشورها و عدم گزارش دهی به WHO را نیز در نظر گرفت. سودان، تنها کشور مدیترانه شرقی است که در کمربند منتزیت آفریقا قرار دارد. این کشور اپیدمی‌های گسترده‌ای را تجربه می‌نماید که هر ۸ تا ۱۲ سال اتفاق می‌افتد. سومالی نیز در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ میلادی شاهد اولین Out Break منتزیت مننگوکوکی بود.

منتزیت مننگوکوکی، همچنین به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در عربستان سعودی در مقطع زمانی اجرای مراسم حج (که میلیونها مسلمان در فاصله زمانی محدودی، گرد هم می‌آیند) و بعد از آن مطرح می‌گردد.

در سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ میلادی و بعد از بازگشت زائرین به کشورهایشان، Out Break منتزیت مننگوکوکی در چند کشور منطقه مدیترانه شرقی، اتفاق افتاد و در بی آن چندین کشور واکسن منتزیت مننگوکوکی را در برنامه ایمنسازی خود ادغام کردند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، عربستان سعودی، شاهد اولین طفیان ناگهانی منتزیت مننگوکوکی با سروتیپ W۱۳۵ در زمان

حج بود که در سال ۲۰۰۱ نیز تکرار شد. از آن زمان، عربستان سعودی انجام واکسیناسیون واکسن مننگوکوک چهارگانه (ACYW/۳۵) را برای زائرین، درخواست نموده است
منزیت پنوموکوکی در منطقه مدیترانه‌شرقی:

رخداد منزیت پنوموکوکی در^۱ EMRO به خوبی مطالعه نشده است. نتیجه مطالعات منتشرشده در این مورد، نشان می‌دهد که استرپتوکوک پنومونیه در ۱۵ تا ۳۵٪ موارد منزیت باکتریال در بین افراد بالای ۱۲ سال دیده می‌شود. برای ارزیابی بروز بیماری ناشی از استرپتوکوک پنومونیه مطالعات جمعیتی انجام نشده است.

۱. منطقه شرق مدیترانه‌ای WHO

عوامل ایجادکننده منزیت باکتریال:

علل عمدۀ ایجاد منزیت باکتریال، هموفیلوس آنفلوانزا، نایسیريا منزیتیدیس و استرپتوکوک پرهمونه هستند که حدود ۸۰٪ از کل موارد را تشکیل می‌دهند. در سالهای اخیر، پس از به کارگیری واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در کشورهای توسعه یافته، میزان بروز بیماری منزیت کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر منزیت باکتریال در آن مناطق، بیشتر در بزرگسالان اتفاق می‌افتد تا در کودکان و نوجوانان.

۱ هموفیلوس آنفلوانزا:

هموفیلوس آنفلوانزا، یک ارگانیسم پلیومورفیک (دارای اشکال متفاوت) گرم منفی است که از جنبه آنتی ژنیک، به شش گروه مختلف از (F تا A)، طبقه‌بندی می‌شود. سرو تایپ B ۹۰٪ موارد را شامل می‌شود. که در نیمی از موارد خود را به صورت منزیت و در نیمی دیگر به صورت‌های مختلف از قبیل سولولیت، آرتیریت و سپسیس نشان می‌دهد.

• شیوع

در دهۀ هشتاد (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰) در کشورهای توسعه یافته، هر سال بین ۴۰ تا ۱۰۰ مورد از ۱۰۰/۰۰۰ کودک زیر پنج سال، به عفونت Hib مبتلا می‌شدند؛ در حالیکه از سال ۱۹۹۵ به بعد

و پس از اسیفاده گستردگی از واکسن کونژوگه Hib (که از ۲ ماهگی به تمامی کودکان، تزریق می‌گردد)، این مقدار به زیر ۲ مورد در ۱۰۰/۰۰۰ کودک تقلیل یافت. به عبارت دیگر، Hib حدود ۴۵ تا ۴۸٪ از موارد بیماری منژیت باکتریال را در این جوامع تشکیل می‌داد که هم اکنون این میزان به حدود ۷٪ تنزل یافته است.

• پیامد بیماری

ابتلا به Hib در حدود ۳ تا ۶ درصد موارد، به مرگ و میر و بیش از ۲۰٪ موارد به ناشنوایی دائم منجر می‌گردد.

• راه انتقال بیماری

از آنجائیکه منبع ارگانیسم مولد بیماری دستگاه تنفسی فوکانی است، راه انتقال بیماری تماس مستقیم فرد با فرد از طریق قطرات تنفسی منتشر شده از نا زوفلونکس افراد حامل یا بیماران خواهد بود.

• گروه پرخطر

کودکان کمتر از ۶ سال (خصوصاً سن بین ۶ تا ۱۲ ماهگی) که در معرض تماس با فرد آلوده مقیم در خانه یا در مراکز نگهداری کودکان قرار دارند، گروه پرخطر را تشکیل می‌دهند. جداسازی این ارگانیسم از کودکان با سن بالاتر و افراد بالغ، احتمال وجود علل زمینه ساز از جمله سی رهیزیت، عفونت گوش میانی، اپی گلوبولیتی، پنومونی، دیابت ملیتوس، الکلیسم، اسپلنکتومی یا Asplenia، ضربه‌های مغزی با نشت CSF و نقص سیستم ایمنی (از قبیل هیپوگاما گلوبولینمی) را مطرح می‌سازد.

• چالشهای موجود در برخورد با ارگانیسم

قابلیت واکسن کونژوگه موجود در ایجاد مصونیت کودکان در سنین خیلی پایین متفاوت بوده و توانایی آن در ایجاد آنتی بادی مدت دار، سؤالاتی را در خصوص اثربخشی طولانی مدت (بیش از ۵ سال) واکسن، مصرف بهینه آن و در نهایت گنجاندن آن در برنامه واکسینا سیون کشوری، مطرح نموده است.

• توصیف بالینی

منتزیت Hib، نوعی منتزیت باکتریال با مشخصات کلی تب ناگهانی، سردرد و سفتی گردن و علائم عصبی^{*} است. اما این نوع منتزیت، مشخصه اختصاصی ندارد و با سایر منتزیتها از نظر بالینی تفاوتی ندارد. و تشخیص قطعی آن از طریق بالینی، امکان پذیر نیست.

* علائم عصبی شامل : کرنیگ، بروودزینسکی، تشنج و فوتانل بر جسته هستند.

- کرنیگ (Kernig's Sign) : فرد در وضعیت درازکش قرار می گیرد و ران و زانو توسط فرد معاينه کننده خم شده (Flexion) و بر روی شکم قرار می گیرد سپس معاينه کننده مفصل زانو را تدریجأ باز می نماید. در فردی که مبتلا به منتزیت است به همراه کتییده شدن ساق پا مقاومت و درد پشت ران و کمر، ایجاد می گردد.
- بروودزینسکی (Brudzinski Sign) : خم کردن غیر فعال گردن فرد مبتلا به منتزیت، منجر به خم شدگی مفصل های ران و زانوی وی می گردد.

• مشخصه های آزمایشگاهی برای تشخیص :

کشت : جداسازی میکروب Hib از مایعات استریل بدن از قبیل CSF و خون، تشخیص را مسجل می کند و جدا کردن میکروب از نواحی غیراستریل از قبیل گلو (محلی که باکتری می تواند در شرایط غیر از بیماری نیز وجود داشته باشد)، به طور قطع نمی تواند نمایانگر بیماری باشد.

جستجوی آنتیژن : مشخص نمودن آنتیژن Hib در مایعات استریل، به وسیله روش های از قبیل آگلوتیناسیون لاتکس (LA) یا کانتایپ میکتروفورزیس (CIE)^۱، مقدور می باشد.

۲ نایسرا یا منتزیتیدیس :

یک دیپلوكوک گرم منفی، و عامل بیماری منتزیت منگوکوکی است. دارای سروتاپ های متعددی (A, B, C, ۲۹-E, H, I, K, L, W۱۳۵, X, Y) است که از اختلاف در کپسول های پلی ساکاریدی آنها ناشی می شود.

بیماری منزیت منگوکوکی به هر دو صورت تک گیر و همه گیر می تواند خود را نشان دهد. سروتاپ B عامل عمدۀ بروز موارد تک گیر است و سروتاپ های C و A بیشترین عوامل بروز همه گیری ها هستند.

بیشترین افراد در گیر را کودکان زیر ۵ سال تشکیل می دهند و میزان مرگ و میر این بیماری حدود ۵ تا ۱۵ درصد است.

منطقه زیر صحرای آفریقا (Sub - Saharan Africa) که اصطلاحاً منطقه کمربند منزیت (Meningitis Belt) نیز نامیده می شود، بیشترین همه گیری ها را دارد. بیماری منزیت می تواند در فصل خشک در این منطقه شروع شود و هم زمان چند کشور را در گیر نماید و در فصل بارانی خاتمه یابد.

عوامل محیطی مثل بارندگی کم، رطوبت پائین، طوفان، گرد و خاک و همچنین عوامل مربوط به خود انسان مثل آسیب دیدن سدهای مخاطی طبیعی از جمله عوامل مستعد کننده بروز این بیماری به شمار می روند.

۱. Counter Immuno Electrophoresi

در جریان همه گیری ها، احتمال می رود بیش از یک نفر، از هر صد نفر، دچار بیماری گردند که در صورت عدم درمان، حدود ۷۰ درصد آنها خواهند مرد ولی با درمان صحیح میزان مرگ و میر نزدیک به ۱۰ درصد خواهد بود.

۳ استرپتوکوکوس پنومونیه :

استرپتوکوک پنومونیه، شایعترین عامل اتیولوژیک منزیت باکتریال در آمریکا است . در سابقه مبتلایان به منزیت ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، غالباً عفونت پنوموکوکی از قبیل : پنومونی، اوتیت مدیا، ماستوئیدیت، سینوزیت و اندوکاردیت وجود دارد. عفونت جدی ناشی از S.P معمولاً در موارد خاص مثل برداشتن طحال یا Asplenia، مولتیپل میلوما، هیپوگاماگلوبولینمی، الکلیسم، سوء تغذیه، بیماری مزمن کبدی یا کلیوی، بدخیمی و دیابت ملیتوس، ایجاد می شود. در بیماران با شکستگی قاعده جمجمه و نشت مایع CSF، شایعترین علت ایجاد منزیت بشمار می رود؛ همچنین بدنبال ایجاد فیستول بین ساب آرکنوئید و حفره بینی، سینوس پارانازال یا گوش میانی نیز می تواند در این گروه از بیماران، منزیت راجعه ایجاد نماید.

پروفیلاکسی

۱) کمپرووفیلاکسی

۱- هموفیلوس آنفلوانزا :

سن عامل مهمی در انتقال بیماری به شمار می‌رود به طوریکه در ۷۵٪ کودکان کمتر از ۲ سال، در عرض ۶ ساعت بعد از شروع تماس، بیماری ثانویه بروز می‌نماید. در افرادی که در منزل تماس داشته و درمان نشده اند، خطر ابتلاء به Hib، حداقل تا یک ماه بعد از شروع تماس با فرد مبتلا وجود دارد.

- در حال حاضر برای افراد ۲ ساله یا بیشتر که در مهدکودک ها با بیماران مبتلا به هموفیلوس تماس داشته اند، کمپرووفیلاکسی توصیه نمی‌شود مگر آنکه در مدت ۶۰ روز، حداقل دو مورد از ابتلا به منتشریت هموفیلوسی در آن مهدکودک گزارش شده باشد.
- در کودکان کمتر از ۲ سال، کمپرووفیلاکسی در صورت تماس طولانی مدت انجام می‌پذیرد.
- در تماسهای خانگی، در صورت وجود یک کودک زیر ۴۸ ماه، باید همه افراد خانواده منجمله بالغین، طبق دستور العمل، کمپرووفیلاکسی شوند.

روش پیشگیری دارویی با ریفامپین در بالغین و کودکان به صورت زیر می‌باشد:

| بزرگسالان | ریفامپین | ۲۰ میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به‌مدت ۴ |
|-----------|----------|--|
| کودکان | ریفامپین | ۱۰ میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به‌مدت ۴ |

- غیر از ریفامپین، سفتریاکسون و سفوتاکسیم را نیز می‌توان به‌منظور رفع کلونیزاسیون این ارگانیسم در نازوفارنکس، تجویز نمود.

۲- نیسريا مننژیتیدیس:

کمپروفیلاکسی در تماسهای نزدیک با بیماران مبتلا به بیماری مهاجم مننگوکوکی، ضروری است. در ۱۰٪ موارد عفونت با نیسريا مننژیتیدیس، سابقه تماس با مورد شناخته شده، وجود دارد. شیوع ناقلين در آمریكا در شرایط غیراپیدمیک ۵ تا ۱۰ درصد است. در مراکز تجمعی بسته (مثل سربازخانه‌ها) میزان انتقال ۴۰ تا ۹۰ درصد است. در تماسهای خانگی با مبتلایان به این نوع مننژیت، ریسک ابتلای به بیماری ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد برابر و حتی ۳ تا ۴ هزار برابر افزایش می‌یابد.

بیماری مننگوکوکی سیستمیک ثانویه در ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد در مدت دو هفته بعد از تماس اولیه و غالباً در مدت ۵ روز بعد از شناخته شدن فرد مبتلا رخ می‌دهد.

در تماسهای نزدیک با فرد مبتلا شامل: تماسهای خانگی (افراد خانواده یا هم اتفاقیهای وی در خوابگاه)، مراکز نگهداری روزانه (مربیان و هم کلاسی‌ها) و افراد در معرض تماسهای مستقیم با ترشحات فرد بیمار (از طریق بوسیدن، احیاء دهان به دهان، گذاشتن لوله تراشه، دستکاری لوله تراشه، غذا خوردن مشترک، تماس‌های با ریسک بالا و ...)، توصیه می‌شود.

در درمان دارویی افراد مبتلا به عفونت های مننگوکوکی، غیر از نسل سوم سفالوسپورین ها، داروهای دیگر مانند: پنی‌سیلین با دوز بالا و کلرامفینیکل، قادر به ریشه کنی حالت ناقلی در آن افراد نیستند لذا در صورت درمان با این داروها لازم است فرد بیمار قبیل از ترجیح از بیمارستان، یکی از داروهای مطرح شده برای پیشگیری آنتی‌بیوتیکی را دریافت نماید تا عفونت به دیگران منتقل نگردد.

کمپروفیلاکسی باید در اسرع وقت (در ۲۴ ساعت اول بعد از تماس) انجام شود زیرا بعد از آن تأثیر کمتری خواهد گذاشت.

نوع داروی مورد استفاده برای کمپروفیلاکسی در مننگوکوک مورد بحث است. براساس توصیه CDC^۱، ریفامپین (که در سیستم بهداشتی کشور ما نیز در دسترس قرار دارد) با فواصل ۱۲ ساعت به مدت ۲ روز با دوز هر نوبت ۲۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg) برای بالغین و ۱۰ mg/kg برای کودکان یک ماهه و بزرگتر و ۵ mg/kg در شیرخواران زیر یک ماه داروی مناسب و مؤثری است. گاهی اوقات در صورت مشاهده عوارض ریفامپین، از تزریق Cerrter for Disease Control

عضلانی 250 mg سفتریاکسون به عنوان داروی جایگزین در بالغین استفاده می‌شود که می‌تواند در مدت دو هفته باعث حذف $\% ۹۷$ موارد سروگروپ A گردد. در خانمهای حامله، این دارو مناسبترین و سالمترین دارو به جای ریفامپین است. دوز واحد سیپروفلوكسازین خوراکی (۵۰۰ mg) در بالغین نیز در حذف نیسیریامنتریتیدیس در نازوفارنکس افراد ناقل، بسیار مؤثر بوده است اما استفاده از آن در اطفال به علت آسیب به غضروف، توصیه نمی‌شود. در تماسهای با ریسک کم، به علت اجتناب از پیدا شدن میکرووارگانیسم های مقاوم به درمان، لازم است از انجام کمپروفیلاکسی در سطح وسیع، پرهیز شود.

تجویز کمپروفیلاکسی با آنتی بیوتیکهای مذکور، به صورت ذیل است :

| | | |
|--------------------|----------|--|
| بزرگسالان | ریفامپین | هر 12 ساعت، ۶۰۰ میلی گرم به مدت ۴۸ ساعت (مجموعاً ۴ دوز) |
| کودکان بالای یکماه | ریفامپین | هر 12 ساعت، ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم به مدت ۴۸ ساعت |
| کودکان زیر یکماه | ریفامپین | هر 12 ساعت، ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم به مدت ۴۸ ساعت |

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| بزرگسالان بالای ۱۲ سال | سیپروفلوكسازین | ۵۰۰ میلی گرم خوراکی به صورت تک دوز |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|

یا

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| بزرگسالان | سفلتریاکسون | 250 میلی گرم عضلانی به صورت تک دوز (بی ضرر در حاملگی) |
| کودکان زیر ۱۵ سال | سفلتریاکسون | ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ۱۲۵ میلی گرم |

کشت اوروفارنکس و نازوفارنکس در تعیین نیاز به پروفیلاکسی، کمک کننده نیست. سه داروی مطرح شده، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد در کاهش حامل بودن مؤثر هستند.

۳- استرپتوکوک پنومونیه :

احتمال انتقال ثانویه در تماس با عفونت پنوموکوکی مشخص نیست . Out break هایی از آن در کارگران حفاری، کارگران معدن و سربازان تازه وارد و زندانیان دیده شده است. مطالعات نشان می دهند که در مراکز نگهداری روزانه کمپرووفیلاکسی با ریفامپین با دوز 10 mg/kg بار در روز به مدت ۲ (روز)، باعث کاهش انتقال به میزان 70% شده است. در این زمینه مطالعات بیشتری نیاز می باشد.

(۲) ایمونوپروفیلاکسی

۱- هموفیلوس آنفلوانزا تیپ B :

استفاده از واکسن کوتزوجه Hib، باعث کاهش منژیت Hib در بیش از 90% موارد شده است. در حال حاضر، ۳ نوع واکسن کوتزوجه Hib برای ایمنسازی کودکان گواهی مصرف دریافت کرده اند که براساس توصیه آکادمی اطفال آمریکا، در سنین ۴، ۶ و ۱۰ ماهگی تجویز می شوند. اگر واکسن از نوع کوتزوجه با پلی ساکارید^۱ (Ped vax Hib) باشد، در صورت انجام واکسیناسیون در ۲ و ۴ ماهگی، تجویز دوز ۶ ماهگی آن، لازم نیست.

۲- نیسريا منژیتیدیس :

واکسن منوالان خالص شده از آنتی ژن پلی ساکاریدی کپسولر، قابلیت مناسبی برای تحریک سیستم ایمنی دارد. (نوع سروگروپ C در افراد کمتر از ۲ سال، سیستم ایمنی را کمتر تحریک می کند) واکسن سروگروپ AC در کودکان مدرسه ای و بالغین، بین 85% تا 100% مؤثر است و همچنین توانایی کنترل اپیدمیها را نیز دارد. مدت زمان اثربخشی واکسن در ۳ سال اول بعد از تزریق یک دوز واکسن، کاهش می یابد که در شیرخواران و کودکان نسبت به بالغین محسوس تر است. تولید آنتی بادی باکتریسیدال توسط و کسن چهارظرفیتی ACYW135 پاسخ مناسبی ایجاد می نماید.

۱) PRP-OMP(Poly Ribosyl Ribitol Phosphate Outer Membrane protein conjugate) واکسیناسیون گروههای در معرض خطر به همراه کمپرووفیلاکسی نیز (گرچه اثربخشی آن ثابت نشده است) توصیه می‌گردد. این گروهها شامل موارد ذیل است:

۱۰. افراد دچار کاهش یا نقص در عملکرد کمپلمان انتهایی (C5-C9) یا پروپرдин :

۱۱. بیماران بدون طحال یا بدون عملکرد مناسب طحال :

۱۲. افرادیکه به مناطق هیپراندمیک یا اپیدمیک سفر می‌کنند (مثل نیجریه) :

۱۳. سربازان تازه وارد به سربازخانه‌ها :

۱۴. حجاج تمنع و عمره^{*}.

در سایر موارد نیز با نظر مرکز مدیریت بیماریها انجام می‌گردد.

• استفاده از این واکسن به طور گستردۀ در برنامه واکسیناسیون جاری کشور، به علت پایین بودن میزان ابتلاء به عفونت، عدم ایجاد ایمنی در مقابل مننگوکوک نوع B و همچنین در بچه‌های کم‌سن، توصیه نمی‌شود.

۳- استرپتوکوک پنومونیه :

واکسن پنوموکوک ۲۳ ظرفیتی، برای جلوگیری از بیماریهای پنوموکوکی در بعضی از گروه‌های پرخطر شامل: افراد ۶۵ ساله و بیشتر؛ افراد ۲ تا ۶۴ ساله دارای بیماریهای مزمن قلبی ریوی و یا ریوی مزمن، دیابت، الکلسیم، کبدی، نشت CSF؛ افراد بد ون طحال (نقص عملکرد یا آناتومیک)؛ افراد دچار نقص ایمنی ناشی از عفونت HIV و بدخیمی‌های عمومی یا خون، نارسایی مزمن کلیه، سندروم نفروتیک؛ افراد تحت کمoterapی و دریافت کنندگان عضو یا پیوند مغز استخوان، تجویز می‌شود. اثربخشی این واکسن در پیشگیری از منتهیت پنوموکوکی، اثبات نشده است و در مورد اثربخشی آن در شیرخواران و کودکان کم سن نیز هنوز مطالعات کافی، انجام نگردیده است.

برنامه مراقبت منزلي در ايران

در كشور ايران، سابقه گزارش دهی موارد منزلي، از سال ۱۳۶۰، وجود داشته و از سال ۱۳۷۵ نيز جمع آوري موارد به تفكيك دانشگاه های علوم پزشكى، آغاز شده است . حداكم ميزان بروز بيماري منزلي از ۳ مورد در هر صدهزار نفر در سال ۱۳۶۲ به ۰/۵ مورد در صدهزار نفر در سال ۱۳۶۷ رسيده است. در سال ۱۳۷۵ جمع آوري موارد به تفكيك دانشگاه های علوم پزشكى صورت گرفته و ميزان بروز منزلي افزاييش داشته است که می توان دليل آن را بهبود كيفيت گزارش دهی دانست.

هر ساله حدود ۲۰۰۰ مورد جديد مبتلا به منزلي از طريق مراكز بهداشتی درمانی و بيمارستانهای سطح كشور، گزارش می شود که حدود ۱۰٪ آن، منزلي منگوکوکی است . از تعداد موارد مشکوك (که مایع نخاع آنها مورد آزمایش قرار گرفته) و نسبت موارد قطعی به مشکوك، اطلاعات دقیقی در دست نمي باشد. در سال ۱۳۸۰، تعداد موارد به ۳/۸ مورد در صدهزار نفر رسيده و از آن پس تا سال ۱۳۸۲، تعداد موارد گزارش شده کاهش داشته که خود می تواند ناشی از کاهش ابتلاء یا عدم گزارش دهی دقیق و كامل باشد.

داده های مراقبت منزلي، تاکنون براساس منزلي منگوکوکی، وغيرمنگوکوکي گزارش شده است. ارتقاء نظام مراقبت منزلي در كشور و اصلاح ساختار موجود بدنبال تأكيد سازمان جهانی بهداشت بر تعين گونه های پاتوژن آن، امری ضروري است. لذا برآنيم تا ضمن فراهم نمودن و بازسازی تجهيزات و امكانات و استفاده بهينه از توانمندي نيري انساني موجود، بتوانيم با نگرشی جامع تر اين بيماري را در كشور كنترل نمائيم و از بار مرگ و مير، ناتوانی و ابتلاء به آن بکاهيم.

كنترل بيماري منزلي در كشور، به سيستمي با عملکرد مناسب به منظور گزارش دهی موارد بيماري و مرگ و مير ناشی از منزلي احتمالي در كليه استان ها و آزمایشگاه های مجهز به منظور تشخيص قطعی موارد اوليه بيماري در شرایط اپيدمي يا غيراپيدمي در هر شهر و همچنين امكانات پيشگيری و درمان، نياز دارد لذا ضرورت بازنگري و اصلاح سيستم گزارش دهی موجود، ارزیابي و نظارت بر تشخيص، درمان و پيشگيری صحيح و به هنگام در نظام مراقبت

این بیماری به گونه‌ای که پاسخگوی نیازهای پیشگیری و کنترل آن در کشور باشد، پیش از پیش احساس می‌شود.

نظام مراقبت

اهداف کلی :

۱. دستیابی به وضعیت موجود بیماری در کشور و ارزیابی برنامه واکسیناسیون فعلی
۲. تعیین بروز، شیوع، مرگ، بستری در بیمارستان و ناتوانی و بار بیماری در کشور
۳. تعیین ضرورت ادغام واکسن‌های جدید در برنامه ایمنسازی کشور.

اهداف اختصاصی :

۱. تعیین موارد کشت مثبت و نسبت آن به کل موارد مظنون؛
۲. تعیین میزان انواع باکتریال (Hib، استرپ پنومونیه و نیسیریا منژیتیدیس) و مرگ ناشی از آنها؛
۳. شناخت زودرس اپیدمی‌ها و برخورد به موقع با آنها؛
۴. تعیین مقاومت و حساسیت میکروب‌های مولد منژیت به آنتی بیوتیک‌های مصرفی در کشور.

اهداف مراقبت آزمایشگاهی منژیت باکتریال:

۱. تعیین بار بیماری حاصل از انواع مختلف منژیت باکتریال؛
۲. تعیین وضعیت مقاومت میکروبی عوامل پاتوژن؛
۳. ساماندهی وضعیت کلینیکی بیماران؛
۴. پایش اثربخشی برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس اپیدمی‌های منژیت منکوکوکی.

• هدف WHO، تقویت مراقبت آزمایشگاهی برای منزّیت های باکتریال از طریق توسعه شبکه مراقبت است که با به کارگیری استانداردهای کلینیکی و تجهیزات آزمایشگاهی به منظور تشخیص عوامل پاتوژن بیماری، انجام می شود.
مراقبت آزمایشگاهی منزّیت باکتریال (به علت S.P, N.m, Hib) با وجود موارد ذیل، قابل انجام است :

۱. پیشرفت و تقویت برنامه های ملی پیشگیری و کنترل منزّیت باکتریال

۲. ترسیم بار بیماری و روند منزّیت به علت جرم های مذکور از طریق
- محاسبه موارد بروز و مرگ ناشی از آن
- مشخص نمودن گروه های سنی و مناطق جغرافیایی مختلف
- تعیین سروگروپ و مقاومت آنتی میکروبیال.

۳. فراهم نمودن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد به منظور مدیریت و سازماندهی بیماران مبتلا به منزّیت باکتریال

۴. فراهم نمودن اطلاعات صحیح، دقیق و کامل برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری و کنترل منزّیت باکتریال

۵. کمک به تشخیص زودرس و کنترل اپیدمی منزّیت

۶. ارزیابی و پایش روند بیماری، بخصوص ارزیابی اثربخشی برنامه کنترل شامل واکسیناسیون Hib و واکسن های جدید کوئنزوگه و سایر فعالیتهای پیشگیری.

اصول نظام مراقبت منزّیت باکتریال :

- داشتن سیستمی در مناطقی محدود با کیفیت عملکرد خوب نسبت به داشتن سیستمی ملی با عملکرد ضعیف، ارجح است.

- برای توصیف دقیق بار بیماری، باید تمامی موارد مظنون، تعیین تکلیف شده و از نظر کلینیکی و آزمایشگاهی به صورت استاندارد ارزیابی شوند. (شامل: جمع‌آوری و بررسی نمونه CSF برای کشف ارگانیسم عامل آن).
- یک فرد هماهنگ کننده درسطح مرکزی مراقبت در کشور که با فرد مشابه در هر منطقه گزارش دهی موارد منزهیت، تماس داشته باشد، تعیین گردد.
- تشخیص قطعی آزمایشگاهی و تعیین و شناسایی سروتیپ برای انتخاب واکسن مناسب در واکسیناسیون همگانی، بسیار ضروری است.
- مقاومت دارویی می‌تواند برای درمان رده اول بیماران با منزهیت باکتریال، نقش تعیین کننده داشته و یک سیستم هشداردهنده را برای ضرورت تعیین سوش‌های مقاوم، فراهم سازد.

اطلاعات مورد نیاز :

- تعداد موارد مظنون و قطعی منزهیت ؛
- تعداد موارد مرگ در بین موارد مظنون و قطعی ؛
- تعداد دوز واکسن منزهیت (مننگوکوک) به کار رفته و پوشش آن در سال ؛
- موارد تشخیص قطعی آزمایشگاهی و تعیین عامل پاتوژن براساس سن، محل زمان تشخیص (ماه و سال) ؛
- تعیین موارد بیماری با تشخیص آزمایشگاهی، بدنبال واکسیناسیون ؛
- گزارش صفر موارد.

اطلاعات قابل گزارش:

- .۱. اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، شغل) ؛
- .۲. تاریخ گزارش براساس روز / ماه / سال ؛
- .۳. منطقه جغرافیایی (نام روستا / شهر / استان و آدرس محل سکونت فعلی) ؛

۱۴. تاریخ پذیرش براساس روز / ماه / سال :

۱۵. وضعیت بیماری :

۱۶. تشخیص نهایی :

۱۷. وضعیت ترجیحی :

۱۸. وضعیت واکسیناسیون :

۱۹. نوع نمونه :

۲۰. ظاهر نمونه CSF :

۲۱. نتیجه رنگ آمیزی گرم :

۲۲. نتیجه لاتکس آگلوتیناسیون :

۲۳. نتیجه کشت :

۲۴. تعیین سرو گروپ :

۲۵. تقسیم بندی نهایی.

انواع سیستم مراقبت :

کشورهای مختلف به منظور تقویت مراقبت بیماران منزلي، ممکن است از سه روش ذيل استفاده نمایند :

۱. مراقبت ملی مبتنی بر جمعيت^۱ :

۲. مراقبت مبتنی بر جمعيت در مناطق منتخب^۲ :

۳. مراقبت ديده و آزمایشگاهی در مراکز دارای امکانات لازم^۳.

نظامهای مذکور، پتانسیل های مختلفی برای پایش بیماری و دستیابی به اهداف مراقبت دارند . ایدهآل این است که در کشور، برنامه ملی مراقبت طراحی شود. اما این امر به علت چالشهای از قبيل کمبود تجهیزات و منابع، تاکنون امكان پذیر نشده است . واقعیت این است که در کشورهای بزرگ، بیماران به دنبال درمان مناسب به مراکز مختلفی از جمله مراکز درمانی خصوصی، ارتش، دانشگاه و بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند که خود، مراقبت در سطح ملی را می طلبند حالیکه در کشورهای با منابع محدود، ابقاء مراقبت منطقهای در مراکز دارای تسهیلات مناسب و سپس گسترش تدریجی آن به سایر مراکز، منطقی ترین روش در تقویت مراقبت منزلي است.

۱- مراقبت ملی مبتنی بر جمعيت (مراقبت جاري در کشور) :

کلیه استانها به داشتن سیستم گزارش دهی کامل موارد منزليت، تشویق می شوند. با وجود سیستم مراقبت جاري، ظرفیت آزمایشگاهی در بیشتر مناطق کشور کم است و در حال حاضر توسعه آن در چارچوب ملی، امكان پذير نیست.

- در چنین وضعیتی، تداوم مراقبت پاسیو در چارچوب کشوری و همچنین توسعه مراقبت منطقهای مبتنی بر جمعيت با تقویت ظرفیت آزمایشگاهی، بیشتر مورد ملاحظه قرار می گيرد.
- 1- National population based surveillance
 - 2- Sub- National population based surveillance in selected sites
 - 3- Sentinel laboratory based surveillance

۲- مراقبت مبتنی بر جمعیت در مناطق منتخب :

در صورتیکه کشور توانایی اجرا و ابقاء مراقبت ملی مبتنی بر آزمایشگاه را نداشته باشد، اجراء برنامه مراقبت مبتنی بر جمعیت در حداقل یک منطقه با جمعیت مشخص که مهاجرت کمتری به داخل و خارج داشته باشد و بتواند بیانگر نمونه‌ای از کل جمعیت باشد، الزامی است.

معاييرهای لازم در جمعیت منتخب :

۱. جمعیت، ۱ تا ۲ میلیون رفر باشد یا حدود ۱۵۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰ کودک زیر ۵ سال داشته

باشد (به علت کافی بودن تعداد موارد قابل انتظار سالانه).

۲. از نظر جغرافیایی، دارای حدود مشخص باشد و مهاجرت به داخل و خارج، نداشته باشد .

میزان موالید، جمعیت کودکان تا ۴ سال و میزان اختصاصی سنی بیماری، قابل محاسبه باشد.

۳. تمامی مراکز بهداشتی - درمانی (شامل همه بیمارستان های دولتی و خصوصی)، که

تشخیص و درمان منژیت را انجام می دهند، باید در اجرای برنامه، مشارکت نمایند یا

ظرفیت کافی آزمایشگاهی داشته و یا دستیابی به چنین ظرفیتی برای آنها امکان پذیر باشد.

۴. در بیمارستانها و آزمایشگاهها از روش‌های تشخیصی مناسب و متداول استفاده گردد.

۵. جمعیت ساکن باید دسترسی مناسبی به امکانات بهداشتی در خصوص بیماری منژیت

داشته باشند و امکانات در سطح بالا نیز از طریق مرکز بهداشتی مرتبط، در اختیار مردم قرار گیرد.

۶. استاندارد مراقبت به گونه‌ای باشد که تمامی افراد تحت مراقبت با علائم بیماری منژیت، LP شوند.

جمعیت شهری، مناسب ترین جمعیت برای مراقبت است . به طوریکه از نظر جغرافیایی، قابل افتراق از دیگر مراکز جمعیتی بوده و از طریق یک یا چند مرکز بهداشتی - درمانی، سرویس داده می شوند.

۳- مراقبت منطقه‌ای مبتنی بر آزمایشگاه :

اگر مراقبت مبتنی بر جمعیت، امکان‌پذیر نباشد، یک منطقه می‌تواند در تعیین بار منتشریت و انواع پاتوژنهای عامل آن، کمک نماید. برای این منظور، براساس موقعیت کشور، یک یا چند منطقه دارای شرایط ذیل، می‌توانند انتخاب شوند :

- حداقل یک مرکز با امکانات درمان منتشریت در آن منطقه، وجود داشته باشد (مثالاً بیمارستان اطفال، عفونی یا عمومی).
- به جمعیت مرتبط با آن، سرویس دهنده.
- در موارد مظنون به منتشریت، به عنوان یک روش معمول، LP انجام شود.
- دسترسی به موقع به تشخیص آزمایشگاهی، امکان‌پذیر باشد.

با توجه به توضیحات پیشگفت، آنچه اکنون در کشور وجود دارد، مراقبت ملی مبتنی بر جمعیت است که خود از جنبه های مختلف به تقویت نیاز دارد . لذا برای دستیابی به اطلاعات دقیق و واقعی از وضعیت منتشریت (خصوصاً نوع باکتریال آن به تفکیک جرم های پاتوژن) و رسیدن به اهداف مراقبت با در نظر گرفتن منابع انسانی و مالی موجود، دو دسته فعالیت، منطقی به نظر می‌رسد :

۱. اجرای مراقبت منطقه‌ای مبتنی بر آزمایشگاه در چند منطقه کشور، به طوریکه بتوانند نماینده کل کشور باشند.

۲. تقویت سیستم مراقبت ملی مبتنی بر جمعیت در مراحل مختلف ، به طوریکه طی برنامه زمان‌بندی شده در طول ۲ تا ۳ سال، اجرای برنامه مراقبت منتشریت در تمامی استانها (متنااسب با وضعیت بروز و شیوع در هر استان)، امکان‌پذیر باشد.

در سال ۱۳۸۳، با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آمادگی استانها، مرکز مدیریت بیماریها با همکاری بخش‌های مرتبط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی، تقسیم‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراحل زمان‌بندی آن را (در راستای تقویت نظام مراقبت منتشریت بر مبنای جمعیت و گزارشدهی کامل موارد باکتریال به تفکیک جرم پاتوژن)

انجام داد. تا اجرای این مهم در سرتاسر کشور، لازم است شرایط ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های واجد امکانات تشخیصی مطابق دستورالعمل آزمایشگاهی موجود، فراهم گردد. همچنین مراقبت منطقه‌ای مبتنی بر آزمایشگاه نیز در قالب طرح تحقیقاتی، حداقل در ۵ شهر کشور که در مناطق مختلفی قرار گرفته اند (به همراه ۲ بیمارستان در تهران به منظور تعیین نسبت شیوع انواع مختلف جرم‌های پاتوژن)، در حال اجرا است.

تشخیص منژیت باکتریال:

تعاریف و تقسیم‌بندی موارد:

مظنون: هر فردی در هر سنی که شروع ناگهانی تب بالای C ۳۸/۵ رکتاب یا ۳۸ درجه زیر بغل داشته و یکی از علائم: سفتی گردن، کاهش سطح هشیاری، علائم منژیال (سردرد، استفراغ و هر نوع عارضه نوروولژیک ناگهانی)، فونتانل برجسته (در اطفال) در وی بروز نماید.

محتمل: هر مورد مظنونی که آزمایش CSF او، حداقل یکی از موارد زیر را نشان دهد:

۱. ظاهر کدر و چرکی؛

۲. پلئوسیتوز (بیش از ۱۰۰ سلول / mm^3)؛

۳. پلئوسیتوز (۱۰۰-۱۰۰۰ سلول / mm^3) به همراه افزایش پروتئین (< 100 میلی‌گرم/dl)؛
یا کاهش قند (> 40 میلی‌گرم/dl)؛

۴. وجود یکی از نتایج زیر در رنگ‌آمیزی گرم:

- باسیل گرم منفی (مطرح‌کننده هموفیلوس آنفلومنزا)؛

- دیپلوكوک گرم مثبت (مطرح‌کننده استرپتوکوک پنومونیه)؛

- دیپلوكوک گرم منفی (مطرح‌کننده نیسريا منژیتیدیس)؛

قطعی: هر مورد محتمل یا مظنون با یکی از علائم زیر:

- کشت مثبت CSF یا خون با جداسازی S.P, N.m, Hib (معیار استاندارد طلایی برای تشخیص قطعی) یا
- پیدا کردن آنتیژن مربوط به S.P, N.m, Hib در مایع مغزی- نخاعی از طریق لاتکس آگلوتینیشن تست در صورت دسترسی.

*Gold Standard

محورهای مورد توجه در برخورد بالینی با بیمار مظنون به منزیت : جمع‌آوری و ارسال نمونه :

منزیت، یک اورژانس پزشکی است و آنالیز باکتریولوژیک CSF، بخشی مهم از ارزیابی کلینیکی به منظور درمان مناسب بیماران است به طوریکه در شرایط ایده آل، باید امکانات زیر موجود باشد :

۱. در هر بیمارستان، محلی برای انجام LP، در نظر گرفته شود. امکانات لازم از قبیل *فرمehای درخواست آزمایش و دفتر ثبت، باید در این محل نگهداری شوند.
۲. یک نفر پزشک در تمام ساعت برای انجام LP در دسترس باشد.
۳. در هر بیمارستان گزارش دهنده، باید دفتر ثبت بیماران وجود داشته باشد و نام تمام موارد مظنون به منزیت، در آن ثبت شده باشد به طوریکه در هر زمان که یک نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود در دفتر ثبت گردد.
۴. در مورد تمامی بیماران مظنون به منزیت باید LP انجام شود و این آزمایش، نباید تا روز بعد به تأخیر بیفتد.
۵. LP بایستی قبل از شروع آنتی بیوتیک، انجام شود . استرپتوکوک پنومونیه، نایسريا منزیتیدیس، هموفیلوس آفلوانزا (S.P, N.m, Hib)، ارگانیسم‌های

حساسی هستند و احتمال جداسازی آنها، در صورتیکه به طور مناسب جمع‌آوری شوند و هرچه زودتر به آزمایشگاه فرستاده شوند، بیشتر می‌شود. در صورتیکه قبل از انجام LP آنتیبیوتیک داده شده باشد، زمان شروع و نوع آن یادداشت گردد.

است که در دستورالعمل مراقبت آزمایشگاهی منزیت، توضیح داده شده است. Trans Isolate Medium*

۶. در مواردی که امکان انجام LP وجود ندارد، با صلاححید پزشک، درمان بیمار شروع شود.

۷. LP، تکنیکی تهاجمی است که باید تنها توسط فرد مجبوب و در شرایط استریل، انجام شود. در صورت احتمال وجود منزیت در بیمار، CSF بهترین نمونه بالینی به منظور جداسازی و تعیین هویت عامل بیماریزا است که صرفاً برای مقاصد تشخیصی انجام می‌گردد. نمونه باید مستقیماً در مدت کمتر از یک ساعت) با شکلات آگار، مغذی شده و همچنین به محیط آگار خوندار تلقیح گردد. اگر امکان بررسی میکروبشناسی در این مدت وجود ندارد، لازم است مایع CSF به محیط TI تلقیح شود و تا صبح روز بعد در حرارت ۳۵ درجه سانتیگراد درون انکوباتور، نگهداری شود و در اولین فرصت ممکن به آزمایشگاه منتقل گردد.

۸. قبل از جمع‌آوری CSF، باید در برگ درخواست آزمایش، نام بیمار، نام بیمارستان، نام پزشک، زمان و تاریخ جمع‌آوری نمونه، تشخیص بالینی و سابقه بیمار و همچنین سابقه دریافت آنتیبیوتیک ذکر شود.

روش انجام LP

به‌هنگام انجام LP بایستی بیمار را به پهلو خوابانیده، سر و زانوها به سمت یکدیگر خم شوند به حدی که پیشانی، زانوها را لمس نماید و کاملاً بدون حرکت قرار گیرد. با استفاده از الکل ۷۰٪، طول خطی را که بین ۲ کرت ایلیاک کشیده شده است، تمیز نموده (الکل جهت پاکسازی سطحی و حذف بقاوی‌ای سلولی و چربی از سطح پوست به کار می‌رود)،

سپس به کمک بتادین، آن ناحیه کاملاً ضد عفونی گردد. بعد از خشک شدن بتادین، سوزن وارد شده و حدود ۳-۴ سی سی از CSF کشیده و درون ۳ لوله در پیچ دار استریل، ریخته شود . به ترتیب **لوله اول**، برای بررسی بیوشیمی و هماتولوژی؛ **لوله دوم**، به منظور بررسی میکروبشناسی و **لوله سوم**، برای کنترل کیفی، ارسال گردند. در صورتیکه استخراج مایع

CSF به میزان ذکر شده میسر نباشد بهتر است آزمایش میکروبشناسی در اولویت قرار گیرد . روی لوله آزمایش، برچسبی حاوی اطلاعات لازم (نام بیمار، نام بیمارستان، اتفاق بستری، نام پزشک، نوع نمونه و ساعت جمع آوری و نوع آزمایش درخواستی)، چسبانده شود و سریعاً به آزمایشگاه، منتقل گردد.
از قرار دادن نمونه در یخچال، حرارت زیاد و نور شدید، اجتناب شود.

تأکید می گردد که : نمونه CSF باید در وضعیت کاملاً استریل و در لوله های استریل سر پیچ دار و یا TI مديا، نگهداری شود و برای انجام آزمایش منتقل گردد . لوله های قابل استفاده مجدد، بایستی در اتوکلاو استریل شوند. لوله ها باید دارای برچسب بوده و نام بیمار و شماره لوله روی آنها نوشته شده باشد و سریعاً به آزمایشگاه، منتقل گردد . اگر مقدار CSF جمع آوری شده، اندک است (به اندازه یک لوله)، این لوله باید به آزمایشگاه میکروبشناسی ارسال گردد؛ ولی اگر نمونه زیادتری در دسترس است، لوله اول را برای آزمایش بیوشیمی و سلول بفرستید و لوله دوم را به آزمایشگاه میکروبشناسی ارسال نمایید.

لوله ۱ ← حدود ۲^{CC} برای اندازه گیری پروتئین، گلوکز

لوله ۲ ← حدود ۲^{CC} در بزرگسالان برای انجام کشت و حساسیت آنتی بیوتیکی
(حجم ۱-۲^{CC} برای کودکان) ارسال شود. اگر آزمایشگاه باز نباشد، ۱۵-۲۰ قطره از لوله ۱ به ترانسپورت مدیوم، انتقال می یابد.

لوله ۱۳ ← حجم CC ۱-۲ برای تست کنترل کیفی (باید در جای خشک نگهداشته شود).

بعد از جمع آوری، باید به ظاهر نمونه CSF دقیق شود (شفاف، کدر یا خونی) و همه نمونه‌ها باید سریعاً به آزمایشگاه منتقل شوند (در فاصله ۱ ساعت از زمان جمع آوری). همانگونه که اشاره شد، اگر آزمایشگاه باکتریولوژی در زمان انجام LP باز نیست، پزشک باید نمونه مربوطه را در محیط TI در ۳۵ درجه سانتیگراد و در انکوباتور نگهداری کند.

۹. هر آزمایشگاه بایستی یک دفتر ثبت اطلاعات داشته باشد.

۱۰. هنگامیکه اطلاعات آزمایشگاهی (شامل تعداد سلول، نتیجه کشت و ...) آماده شوند، این اطلاعات نیز در دفتر ثبت گردند.

۱۱. موارد به فرد هماهنگ کننده به صورت روزانه اعلام شود.

• علیرغم اینکه در تمام بیماران، گرفتن CSF لازم است اما در صورتیکه امکان انجام LP یا امکان انتقال بیمار به مراکز مجهز برای انجام LP وجود ندارد، حداقل گرفتن نمونه خون بیمار به منظور کشت، الزامی است.

احتیاطات لازم در تهییه نمونه خون :

هنگام خونگیری از بیمار، امکان انتقال عفونت از بیمار به پزشک و یا بالعکس وجود دارد . عوامل ویرال از جمله ویروسهای مولد هپاتیت و HIV، بیشترین خطر را دارند و ممکن است حتی منجر به عفونت های کشنده گردند . برای کاهش خطر انتقال این عفونتها، رعایت توصیه‌های زیر الزامی است :

الف - از دستکش لاتکس مقاوم در برابر نفوذ مایعات، استفاده شود.

ب - در فاصله ۲ خونگیری از بیمار، حتماً دستکش عوض شود.

پ - خون جمع آوری شده از بیمار، سریعاً به محیط کشت خون، تلقیح شود تا از لخته شدن آن در سرنگ، جلوگیری گردد.

سرنگ و سوزن در ظرف مقاوم در برابر سوراخ شدن و قابل اتوکلاو کردن انداخته شود و از هر نوع تلاش برای گذاشتن سرسوزن، روی سوزن جداً خودداری شود.
برای هر بیمار، سرنگ و سرسوزن جدید استفاده شود.

وظایف فرد هماهنگ‌کننده مراقبت در مرکز ارائه خدمت :

در هر مرکزی که خدمات تشخیص و درمان بیم اران مبتنی به منژیت انجام می‌گیرد، باید فردی (اعم از پزشک یا پرستار) به منظور هماهنگی و با مسئولیتهای ذیل تعیین گردد:

- ۱. تطبیق علائم بیماران پذیرش شده با موارد منژیت :**
- ۲. در نظر گرفتن محلی مناسب و دارای امکانات لازم به منظور تهیه و بررسی اولیه مایع نخاع بیماران مبتنی به منژیت :**
- ۳. حصول اطمینان از تهیه مناسب نمونه کلینیکی مطابق با روش‌های ذکر شده در دستورالعمل :**
- ۴. بررسی تعداد بیماران پذیرش شده در بیمارستان و اطمینان از انجام اقدامات مراقبتی لازم در تمامی بیماران با تشخیص منژیت :**
- ۵. برقراری ارتباط منظم با آزمایشگاه و دریافت روزانه گزارش موارد ثبت شده منژیت :**
- ۶. انجام بازدید هفتگی از محلهای گزارش و جمع آوری اطلاعات و بررسی ثبت آزمایشگاهی :**
- ۷. حصول اطمینان از دقت، صحت و کامل بودن اطلاعات موارد بیماری ثبت شده در دفتر مربوطه :**
- ۸. پیگیری به منظور گرفتن اطلاعات از دست رفته :**
- ۹. حصول اطمینان از گزارش به موقع داده‌ها توسط بخش‌های مربوطه :**

۱۰. برقراری ارتباطی منظم با هماهنگ کننده برنامه مراقبت در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان.

فرم گزارش موارد منتشریت باکتریال باید :

در هر مورد تأیید شده منتشریت همراه با اطلاعات بالینی و جمعیتی، تکمیل شود.

برای تمامی موارد محتمل منتشریت باکتریال نیز تکمیل گردد.

(برای سایر بیماران دارای نمونه CSF، نباید فرم گزارش موارد بیماری تکمیل گردد).

آزمایشگاه میکروبیولوژی لازم است از شرایط ذیل برخوردار باشد:

در هر آزمایشگاه میکروبیولوژی باید حداقل یک نفر میکروبیولوژیست یا کارشناس و یا کاردان آموزش دیده حضور داشته باشد به طوریکه :

۱. با تکنیکهای استریلیزاسیون، آشنایی داشته باشد (استفاده از شعله برای استریل کردن لوپ های تلقیح شده و لبه های ظرفهای مورد استفاده، کاربرد ا توکلاو و معیارهای کنترل کیفی آن و استفاده از فیلتر برای استریل کردن مایعات و).

۲. کاربرد میکروسکوپ را بداند و از میکروسکوپ مناسب برای دیدن لامهای رنگ آمیزی شده و یا کلنی های محیط کشت آگار، استفاده کند. استفاده از PH متر را بداند.

۳. روشهای مورد نیاز برای جداسازی کلنی های باکتری و جداسازی هموفیلوس آنفلوانزا و تکنیکهای لازم برای نگهداری، ذخیره سازی و انتقال به محیط کشت باکتری را بداند.

۴. از اینمنی استفاده از روشها، اطلاع داشته باشد و به انهدام تمامی مواد استفاده شده بعد از انجام عملیات لازم، اقدام نماید.

۵. دستورالعمل نحوه عملکرد روی CSF را بداند و با هماهنگ کننده مراقبت برای تعیین تعداد نمونه ها، ارتباط داشته باشد.

روش‌های آزمایشگاهی بررسی نمونه :

مراقبت منزّیت، نیازمند تشخیص قطعی منزّیت باکتریال در آزمایشگاه است . وجود آزمایشگاه با توان تشخیص منزّیت و اثیولوژی آن برای ارزیابی بار بیماری منزّیت، اساسی است . هر بیمار با علائم و نشانه های منزّیت، باید LP شود و مایع CSF او برای شمارش سلول، پروتئین و قند یا مشاهده مستقیم از نظر شفافیت، ارسال گردد . رنگ آمیزی گرم روی اسمیر CSF نیز باید انجام شده و کشت های پاتوژنهای باکتریال، نیز روی همه نمونه های CSF انجام گیرد.

به طور کلی مهمترین فعالیتهای آزمایشگاهی در هنگام تشخیص مورد مظنون به منزّیت، شامل ۳ دسته ذیل است که در دستورالعمل آزمایشگاه نیز به تفصیل، مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، مطابق دستورالعمل مربوطه ؛

۲. نگهداری نمونه CSF مطابق دستورالعمل آزمایشگاه ؛

۳. کنترل کیفی.

ثبت و جمع‌آوری اطلاعات- سیستم گزارش‌دهی

سیستم مراقبت موارد ذیل را شامل می‌شود :

۱. اجزاء :

- هسته مرکزی در مرکز مدیریت بیماریها ؛
- ستاد استانی و شهرستانی در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ؛
- آزمایشگاه رفرانس مرکزی، رفرانس منطقه‌ای و رفرانس استانی ؛
- آزمایشگاه‌های محیطی در شهرستانها و شهرها ؛

۲. جمع‌آوری اطلاعات بیمار ؛

۳. جمع‌آوری نمونه و کشت CSF برای تشخیص آزمایشگاهی ؛

۱۴. مدیریت اطلاعات و آنالیز آن :

۵. گزارش اطلاعات به وزارت بهداشت و دفتر WHO

با توجه به وضعیت موجود سیستم گزارش دهی و تعداد گزارشات رسیده و لزوم بازنگری تمامی بخشها و سطوح مختلف مراقبت و رفع نواقص موجود، بر لزوم تبیین سیستم مراقبت با شرایط ذیل، تأکید می‌گردد:

- ۱. هسته مرکزی کشوری در محل اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه مرکز مدیریت بیماریها، تشکیل شود و رئیس این اداره به عنوان هماهنگ‌کننده کشوری، تعیین گردد.**
- ۲. هسته دانشگاهی (استانی) در گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی هر دانشگاه تشکیل شود و یک نفر به عنوان هماهنگ‌کننده استانی تعیین گردد.**
- ۳. هسته شهرستانی در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت هر شهرستان، تشکیل شود و یک نفر به عنوان هماهنگ‌کننده شهرستانی، تعیین گردد.**
- ۴. مشخصات مربوط به بیمار مظنون به منژیت که نمو نه CSF وی تهیه شده است، در دفتر مربوطه موجود در مراکز بیمارستانی نوشته شود و با توجه به مندرجات فرم خلاصه اطلاعات، تشخیص نهایی به دقت ثبت گردد.**
- ۵. بعد از تشخیص افراد بیمار، مشخصات دقیق آنها در دفتر ثبت مراکز بهداشتی - درمانی، نگهداری شود و پیگیری لازم برای ادامه درمان آنها همانند سایر بیماران تحت پوشش، صورت گیرد به طوریکه در منطقه تحت پوشش هر مرکز بهداشتی - درمانی، بتوان نسبت موارد تشخیص قطعی را به موارد مظنون، تعیین نمود.**

- ۶.** اطلاعات مربوط به درمان آنتی بیوتیکی استفاده شده و حساسیت یا مقاومت دارویی حاصله نیز در دفاتر و فرم مربوطه در مراکز بیمارستانی درگیر در برنامه مراقبت ثبت شود و به فرم خلاصه اطلاعات، منتقل گردد.
- ۷.** گزارش تلفنی موارد مظنون به منزیت و مرگ ناشی از آن، روزانه از مرکز بهداشت شهرستان، به استان و از هسته مرکزی هر استان (دانشگاه) به مرکز مدیریت بیماریها، ارسال شود.
- ۸.** گزارش هفتگی موارد مظنون بیماری به صورت روتین از مرکز بهداشت هر شهرستان به گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای استان (دانشگاه) ارسال گردد.
- ۹.** گزارش ماهانه که شامل اطلاعات تکمیل شده موارد محتمل و قطعی جدید در آن ماه به همراه موارد محتمل و قطعی گزارش نشده در ماه قبل است در پایان هر ماه به صورت فرم خلاصه اطلاعات به مرکز مدیریت بیماریها، ارسال گردد.
- ۱۰.** گزارش ماهانه باید به وسیله مسئول استانی، کنترل و در صورت نیاز تصحیح گردد.
- ۱۱.** در صورت نداشتن مورد محتمل و یا قطعی مبتلا به منزیت، گزارش ص فر در هر ماه ارسال گردد.
- ۱۲.** داده‌های مراقبت بیماری که شامل موارد ذیل است:
- موارد مظنون و قطعی؛
 - موارد LP انجام شده؛
 - موارد کشت مثبت (در صورت عدم انجام کشت، گزارش وجود سایر علائم آزمایشگاهی که به تشخیص قطعی کمک می‌نماید)؛
 - موارد ابتلاء به منزیت به ت فکیک جرم پاتوژن (مننگوکوک، پنوموکوک و هموفیلوس آنفلوانزا) در مناطقی که امکان تفکیک وجود دارد؛

- موارد مرگ در پی ابتلاء به منزهیت با ثبت عامل اتیولوژیک آن.
در هسته مرکزی هر دانشگاه موجود باشد.

۱۳. نمودار و نقشه مربوط به وضعیت بیماری، واکسیناسیون و انواع ج رم پاتوژن در ستاد استان (دانشگاه) موجود باشد.

۱۴. اطلاعات دریافت شده، پس از آنالیز و تجزیه و تحلیل، به صورت گزارش سالانه در هر دانشگاه تهیه و به مرکز مدیریت بیماریها ارسال گردد و به شهرستانها نیز پس خوراند داده شود.

۱۵. گزارش سالانه کشوری به وسیله مرکز مدیریت بیماریها، تهیه شده و در اختیار تمامی دانشگاهها و سایر مراجع ذیربسط، قرار گیرد.

۱۶. گزارش ماهانه و سالانه، طبق تقویم میلادی، تهیه شود و به دفتر WHO ارسال گردد.

- ارسال گزارش روتین ماهانه در مورد اطلاعات تجمعی موارد قطعی، باید از سوی سطوح محیطی به میانی و در نهایت به سطح مرکزی، انجام شود. به طوریکه تا تاریخ بیستم هر ماه این گزارشات به مرکز مدیریت بیماریها، ارسال گردد.

مراقبت در اپیدمیها

عوامل هموفیلوس آنفلوانزا تیپ B و استرپتوکوک پنومونیه، قابلیت ایجاد منزهیت آندمیک را دارند اما افزایش قابل توجه میزان موارد منزهیت در یک زمان محدود که خود بیانگر اپیدمی است، عمدها ناشی از نیسریامنزیتیدیس خواهد بود.

تعریف اپیدمی بیماری مننگوکوکی :

بروز موارد منثیت بیش از حد مورد انتظار در زمان محدود و در مکان مشخص می‌تواند مطرح کننده اپیدمی باشد. اما به طور کلی میزان ابتلاء بیش از ۱۵ مورد در ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت در هفته و برای مدت ۲ هفته متوالی، می‌تواند بیانگر وقوع اپیدمی وسیع بیماری مننگوکوکی باشد.

میزان آستانه حمله بیماری :

میزان آستانه حمله بیماری در تعیین همه گیری، وقتی جمعیت بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر باشد، روش تعیین کننده بهتری دارد. در جمعیتهای کوچکتر، میزان هفتگی می‌تواند با بروز چند مورد بیماری، به مقدار زیادی تغییر نماید ولی در جمعیتهای بزرگتر، همه گیری‌های موضعی و محدود می‌تواند مورد غفلت قرار گیرد . اگر جمعیت منطقه کمتر از ۳۰ هزار نفر است، گزارش های مناطق مجاور باید با یکدیگر ادغام شوند، به طوریکه جمعیت کلی حداقل به ۳۰ هزار نفر برسد. جمعیتهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر باید هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات، به بخش‌های کوچکتری تقسیم گردد.

میزان آستانه باید :

تا اندازه‌ای پائین باشد که قادر به کشف زودرس اپیدمی‌ها باشد.
تا اندازه‌ای بالا باشد که منجر به تکرار هشدارهای کاذب نشود.

میزان آستانه اولیه :

- میزان آستانه اولیه ابتلاء هفتگی بیماری، ۱۵ مورد در ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت است.
- در صورت افزایش میزان آستانه حمله بیماری طی یک هفته، باید بررسی انجام شود و اگر این میزان، طی دو هفته متوالی، افزایش یابد و بیماری مننگوکوکی به تأیید آزمایشگاه برسد، احتمال وقوع یک اپیدمی گسترده، زیاد است و باید عملیات واکسیناسیون انجام گردد.

میزان آستانه ثانویه :

* میزان آستانه ثانویه ابتلاء هفتگی، ۵ مورد در هر $100/1000$ نفر است که در مورد نواحی مجاور مناطق اپیدمی مننگوکوکال به کار می‌رود.

* هرگاه میزان آستانه ثانویه ابتلاء برای یک هفته، از حد تعیین شده در هر منطقه تجاوز نماید، باید پس از هماهنگی با مرکز مدیریت بیماریها در صورت نیاز واکسیناسیون همگانی انجام شود.

*** محاسبه میزان ابتلاء :**

- $100/1000$ را بر جمعیت تقسیم کرده و ارقام را به 1000 ، گرد می‌کنیم (در جمعیت‌های بین $30/1000$ تا $100/1000$ نفر).

- حاصل را در تعداد موارد گزارش شده در یک هفته، ضرب می‌کنیم. این عدد معادل میزان ابتلاء هفتگی است. آن را با میزانهای آستانه، مقایسه می‌کنیم.
مثال : جمعیت شهرستانی، $50/1000$ نفر است. طی هفته گذشته، 40 مورد منزهیت از میان این جمعیت گزارش شده است.

ابتدا $= 2 = \frac{50}{1000} \div 100/1000$ ، سپس $80 = 2 \times 40$ ، بنابراین میزان ابتلاء در این شهرستان، 80 در $100/1000$ نفر در هفته است.

*** محاسبه آستانه اولیه موارد :**

ابتدا جمعیت را در 15 ضرب می‌کنیم و سپس نتیجه را بر $100/1000$ تقسیم می‌نماییم و آن را به نزدیکترین اعشار، ساده می‌کنیم.

نتیجه آستانه اولیه، تعداد است و آستانه ثانویه ، $1/3$ آستانه اولیه است.

مثال: جمعیت شهرستانی 63270 نفر است ابتدا عدد را به 63000 ، گرد می‌کنیم.
 $63000 \times 15 = 945000$

$\frac{63000}{9} = 6945000 \div 100000 = 69$ نفر در هفته است.

اگر در این شهرستان ۹ مورد در هفته اتفاق بیافتد، نیاز به بررسی وجود دارد و در صورتیکه در دو هفته متوالی، بیش از ۹ مورد بیماری در هفته، بروز نماید و تأیید آزمایشگاهی وجود داشته باشد، باید واکسیناسیون همگانی سریعاً آغاز شود.
اگر در یکی از نواحی همچوار، اپیدمی تأیید شده وجود داشته باشد، با کشف بیش از ۳ مورد بیمار در هفته، باید واکسیناسیون آغاز گردد.

تذکر : انجام واکسیناسیون همگانی پس از تأیید اپیدمی و با هماهنگی مرکز مدیریت بیماریها صورت می‌پذیرد.

* محاسبه مستقیم آستانه ثانویه

جمعیت را در ۵ ضرب می‌کنیم، نتیجه را بر $100/1000$ تقسیم نموده و آن را گرد می‌کنیم؛
نتیجه حاصل، معادل آستانه ثانویه است.
کاربرد آستانه ثانویه :

۱. میزان ابتلاء را که به طور هفتگی محاسبه شده است، پایش نمائیم.
۲. تعداد موارد را نسبت به میزان ابتلاء 15 مورد در $100/1000$ نفر، تعیین نموده و موارد هفتگی را با آن، مقایسه نمائیم.

کشف و تأیید اپیدمی بیماری مننگوکوکی با انجام موارد زیر امکان‌پذیر است.

۱. مراقبت مستمر از طریق :
- گزارش هفتگی موارد مظنون ؛

- پایش هفتگی میزان حمله منژیت در شهرستانها با مقایسه تعداد موارد هفتگی با آستانه، رسم نمودار در هر مرکز در پایان هر هفته و تنظیم نقشه بیماری در هر شهرستان و استان؛
- مراقبت بیشتر در فصول خشک.

۱۰. تأیید آزمایشگاهی با :

- بررسی ظاهر CSF :
- بررسی وجود آنتیژن یا کشت.

۱۱. بررسی اپیدمیهای مشکوک

برخورد با اپیدمیها

۱. تشکیل کمیته کشوری و کمیته هایی در سطح دانشگاه برای مبارزه با بحران در مناطقی که در آن اپیدمی منژیت تکرار می شود. بهتر است کمیته مسئول بیماری مننگوکوکی با شرح وظایف مشخص، وجود داشته باشد. این کمیته، ممکن است بخشی از کمیته کشوری یا کمیته های در سطح دانشگاه باشد که مسئول آماده سازی اضطراری و مقابله با اپیدمی و سایر حوادث است و در صورت شک به وقوع اپیدمی، این کمیته ها باید به سرعت فعال شوند . در صورت عدم وجود چنین کمیته ای، باید به محض وقوع اپیدمی، کمیته مقابله با بحران مننگوکوکی تشکیل شود.

نمایندگانی که باید در کمیته مقابله با اپیدمی، حضور داشته باشند، عبارتند از:

۱. معاون بهداشتی :

۲. معاون درمان :

۱۳. رئیس بیمارستان مرجع برای منژیت :

۱۴. مسئول آزمایشگاه مرجع :

۵. رؤسای بیمارستانهای دیگر در منطقه وجود بیماری، در صورت لزوم؛

۶. مدیرگروه بیماریها؛

۷. پزشک متخصص بیماریهای عفونی؛

۸. پزشک متخصص کودکان؛

۹. مسئول دفتر پرستاری استان؛

۱۰. کارشناسان خبره، در صورت نیاز.

در زمان اپیدمی، جلسات باید به طور مداوم (در صورت امکان به طور روزانه) برگزار گردد و چنانچه فعالیتها به طور مناسب انجام گیرند و بررسی ها نشان دهنده افزایش وقوع بیماری در منطقه ای جدید وجود ندارد، می توان تعداد جلسات را کاهش داد (به طور هفتگی). کمیته مرکزی، وظیفه ایجاد هماهنگی در فعالیتها و توزیع یکسان و مناسب نیروی انسانی و امکانات را دارد و باید دارای اختیار لازم برای انجام اقدام اضطراری باشد . بین وزارت بهداشت و سازمانهای امدادی و سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، کمیسarıای عالی پناهندگان سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی باید ارتباط عملی به شکل مناسب، وجود داشته باشد.

نقش کمیته اضطراری

- برنامه ریزی اجرای استراتژی های مبارزه؛
- تعیین مکان های مسکونی در معرض خطر؛
- تعیین سیاست هماهنگی و حمایت از ارگانهای اجرایی که دارای مسئولیتی مشخص برای مقابله بهداشتی در حالت اضطراری هستند؛
- تعیین مسئولیت های افراد و واحد ها در کشف اپیدمی و مقابله با آن؛

- اتخاذ راهکارهایی به منظور سرعت بخشیدن به برنامه ایمنسازی گروهی Mass Immunization programme؛ در صورت لزوم؛
- تعیین موارد مهم و لازم برای مقابله سریع با اپیدمی و به روز در آور دن اطلاعات آن در دو سطح منطقه‌ای و کشوری؛
- برآورد نیازهای ضروری برای مبارزه با اپیدمی (دارو، تجهیزات، نیروی انسانی، وسایل حمل و نقل، امور مالی)؛
- تخصیص بودجه مناسب؛
- تعیین و تضمین حمایت آزمایشگاهی کافی و مستمر در داخل کشور و استان مربوطه؛
- ارتباط منظم با مراکز بهداشتی و مردم؛
- نظارت دقیق بر عملیات مبارزه و هدایت عملیات اجرایی و انجام آنها.
- در صورت نیاز، لازم است مراکز بهداشتی استانهای مجاور را در جریان ارزیابی، پیگیری نتایج، تعدیل استراتژی‌ها و بررسی گزارش‌ها پس از اتمام اپیدمی، قرارداد زیرا باید مراقب گسترش اپیدمی بود و همچنین باید کارکنان مراکز بهداشتی در منطقه را از میزان انتشار اپیدمی و چگونگی برخورد مناسب با موارد بیماری، عملیات اطلاع رسانی آن و در صورت لزوم برنامه‌ریزی واکسیناسیون آگاه نمود؛
- در دهه هشتاد و نود، اپیدمی مننگوکوکی از مرزهای کشورها، در یک فصل خاص یا از سالی به سال بعد، گذشت. بنابراین گزارش این موارد به مجتمع بین‌المللی که تنها از سوی CDC صورت می‌گیرد، اهمیت فوق العاده زیادی دارد. این مسئله سبب راهاندازی نظام مراقبت فعال بیماری در مناطقی که در آنها خطر وجود اپیدمی در آینده بالاست، می‌شود.

۱۲- اعلام عمومی

مادامیکه عملیات شناخت اپیدمی مننگوکوکی وجود دارد، احتمالاً این قضیه همراه با تلاش‌های گسترده وسایل ارتباط جمعی و نگرانی‌های عمومی، همراه خواهد بود لذا در مراحل اولیه طفیان بیماری باید برای رساندن اطلاعات صحیح به مردم، تلاش نمود تا از هیجان و هراس بی مورد جلوگیری شود. این تلاشها باید در مدت زمان استمرار اپیدمی ادامه یابد.

وسایل ارتباط جمعی می توانند بر آگاهی کارکنان بهداشتی بیافزایند و فرهنگ عمومی جامعه را در مورد نشانه های اولیه بیماری در مدت زمان وقوع اپیدمی، افزایش دهنند. این وسایل باید سبب افزایش آگاهی مردم در موارد ذیل شوند :

- چگونگی انتشار بیماری و نحوه درمان با آنتی بیوتیک های مناسب ؛
- مکان های انجام درمان ؛
- احتمال بهبودی بیشتر بیماری در صورت درمان در مراحل اولیه ؛
- زمان و مکان انجام واکسیناسیون عمومی در صورت لزوم.

اعتقادات مردم محلی مورد ملاحظه قرار گیرد تا تفکرات اشتباه در بین مردم ایجاد نشود و بین وسایل ارتباط جمعی و سازمانهای بهداشتی، همکاری تنگاتنگی در طول مدت اپیدمی، وجود داشته باشد

اطلاع رسانی به مردم از طریق

- رادیو ؛
- تلویزیون ؛
- نشریات ؛
- جلسات با کارکنان بهداشتی و نمایندگان اجتماعی و سیاسی جامعه ؛
- نشریات خبری ؛
- اطلاع رسانی در بازارها، مراکز بهداشتی، مدارس و

۱۱- برنامه ریزی مناسب به منظور ریشه کنی اپیدمی

۱- درمان

در مدت زمان اپیدمی بیماری مننگوکوکی، بیمار باید تحت درمان ساده قرار گیرد تا سیستم بهداشتی کشور، بتواند پاسخگوی درمان تعداد بیشتری از موارد باشد . همچنین ایجاد مراکز بهداشتی کمک کننده با کادر موقت، برای پاسخگویی به آن دسته از افرادی که خارج از محدوده مرکز اصلی بهداشتی هستند، ضروری است . این مراکز کمکی باید به پرسنل و تجهیزات کافی مجهز بوده و در سیستم اطلاع رسانی هم دارای نقش باشند.

تشخیص و گزارش موارد بیماری، باید بر مبنای تعریف استاندارد از بیماری باشد، از آنجاییکه در اپیدمی‌ها تعداد بیماران زیاد است، گاهی انجام پونکسیون مایع نخاع، به عنوان یک عمل روتین امکان پذیر نیست. در چنین مواردی هر حالت مشکوک به منتشرت را باید منتشرت منتگوکوکی دانست و درمان روتین را آغاز کرد. وجود پورپورا در بیمارانی که در طی اپیدمی دارای تب شدیدی هستند، از نظر تشخیص سپتی سمی منتگوکوکی (منتگوکوکسمی) اهمیت ویژه‌ای دارد. در مدت اپیدمی، پروتکل‌های درمانی ساده مناسب‌تر هستند.

غالباً اینگونه فرض می‌شود که به علت کم بودن میزان کمک رسانی، تعداد زیاد بیماران و مشکلات اداری، لازم است تغییراتی در پروتکلهای درمانی پیشنهادی داده شود. . تصمیم‌گیری نحوه درمان این بیماران بعده پزشکان متخصص و براساس شرایط موجود در کشور می‌باشد.

۱۳- ۲ واکسیناسیون

در طی اپیدمی، چنانچه برنامه واکسیناسیون همگانی به شکل صحیحی انجام شود، می‌تواند در مدت چند هفته سبب توقف اپیدمی منتگوکوکی نوع A و C شود. سرعت، عامل بسیار مهمی در برنامه ریزی و اجرای چنین برنامه‌هایی محسوب می‌شود. زیرا دسترسی به واکسن و توزیع آن بسیار وقت گیر است، لذا تدوین برنامه‌ای برای دستیابی به واکسن قبل از بروز اپیدمی، ضروری خواهد بود. کمیته مشورتی، باید تعداد مناطق مشمول واکسیناسیون را در اسرع وقت تعیین کند تا بتواند میزان واکسن مورد نیاز را محاسبه نماید.

از جمله عواملی که باید مدنظر قرار گیرد، توزیع جغرافیایی موارد بیماری و شیوع سنی مبتلایان می‌باشد. واکسیناسیون در منطقه‌ای که اپیدمی شدیدتر است، مرکز می‌گردد.

چنانچه محدودیتی در زمینه کمک‌رسانی و حمایت اداری وجود نداشته باشد، می‌توان تمام مردم را واکسینه کرد؛ در غیر این صورت واکسیناسیون باید در گروه‌های سنی در معرض خطر بیشتر، انجام شود. منطقی است افرادی که در برنامه مبارزه علیه اپیدمی، شرکت دارند (بخصوص کارمندان امور بهداشتی در منطقه)، صرف نظر از گروه سنی شان، قبل از همه واکسینه شوند، از آنجایی که واکسن سروگروپ A، اینمی مناسبی ایجاد می‌کند و در شیرخواران (از سه ماهگی به بالا) مفید واقع می‌گردد، در مدت اپیدمی، می‌توان حتی شیرخواران بالاتر از سه ماه را نیز واکسینه نمود.

لازم است میزان واکسن مورد نیاز برآورده شده و کلیه تمهیدات بمنظور تهیه آن بکار گرفته شود.

نحوه برآورده واکسن مورد نیاز در شرایط اپیدمی:

در مجموعه مسکونی که ساکنین آن حدود ۵۰/۰۰۰ نفر باشند :

در صورتیکه ۷۰٪ ساکنین زیر ۳۰ سال فرض شوند جمعیتی که باید تحت پوشش قرار گیرند، ۳۵۰۰۰ نفر خواهد بود ($۳۵۰۰۰ = \frac{۷}{۱۰} \times ۵۰/۰۰۰$).

چنانچه پوشش واکسیناسیون ۱۰۰٪ در نظر گرفته شود مقدار دوز مورد نیاز ۳۵۰۰۰ دوز خواهد بود که با احتساب میزان پرت حدود ۱۷٪، به ۴۰۹۵۰ افزایش خواهد یافت.

تیم واکسیناسیون:

متشكل است از :

-۱ نفر واکسیناتور :

-۲ نفر مسئول ثبت (ثبتات) :

-۳ نفر پرستار آشنا به عوارض واکسن :

-۴ نفر راننده.

این چنین تیمی، قادر است روزانه با استفاده از سرنگ و واکسن، ۱۰۰۰ نفر را واکسینه کند. در اپیدمیهای آفریقایی - که امکانات نیروی انسانی و تجهیزاتی، بسیار محدود است - دیده شده که با Jeting، افراد بیشتری را می توان واکسینه کرد. انتخاب مجموعه های مسکونی مورد نظر برای واکسیناسیون بستگی به جمعیت ساکن در منطقه و فواصل بین مجموعه هایی که قرار است واکسینه شوند، دارد . برای آنکه بتوان به حداقل تعداد واکسیناسیون روزانه رسید، می بایست گردش افراد در مراکز واکسیناسیون، بسیار منظم و دقیق باشد.

زمان واکسینه شدن در برابر مننگوکوک، باید در کلت واکسیناسیون همگانی افراد ثبت گردد و در صورت نداشتن کارت واکسیناسیون همگانی، بهتر است برای آنها نیز این کارت صادر شود و زمان انجام واکسیناسیون در آن ثبت گردد. این اقدام مانع از بروز اشتباهات می شود و همچنین در نظارت بر پوشش واکسیناسیون، کارآیی واکسن و نیازهای آتی واکسیناسیون نیز مفید خواهد بود. تعداد افرادی که در هر روز واکسینه می شوند باید ثبت شود تا بتوان زمان لازم برای کامل

کردن واکسیناسیون را محاسبه نمود. واکسیناسیون همگانی به شکل دسته جمعی، باید خارج از چارچوب روتین برنامه‌های واکسیناسیون همگانی توسط تیم‌های سیار یا ایستگاه‌های ثابتی که معمولاً در مراکز اصلی بهداشتی وجود دارند، انجام شود.

پیشگیری همگانی در بین افرادی که علائم مشخص بیماری را نشان نداده‌اند (asymptomatic)، به علت عود بیماری، کارآبی لازم را ندارد . سیستم کمپروفیلاکسی کارآ (مثل ریفلمپین یا سفتیریاکسون)، گران بوده و ممکن است سبب تغییر در برخی اولویتهای برنامه شود، اما در اپیدمی های محدود که در مکانهای مسکونی سریسته شیوع دارد (مانند اردوگاه‌ها، سربازخانه‌ها و مدارس)، اقدام به کمپروفیلاکسی مناسب است.

۱۳- ۱۳- تدابیر عمومی

علیرغم وجود شک درباره شرایط انتقال مننگوکوک، در محل های تجمعی شلوغ مانند : بازار و مناسبت‌های اجتماعی یا دینی، احتمال این انتقال، افزایش می یابد. این مسئله، سبب توصیه بعضی از سازمانها به تعطیلی بازار و مدارس و گردهمایی‌ها، به منظور انجام بهتر عملیات مبارزه علیه منژیت، شده است. اما کارآبی اینگونه تدابیر، هنوز در جایی به ثبت نرسیده است و از سوی دیگر، دیده شده که باعث بروز اضطراب عمومی می‌شود.

واکسن‌ها را با کمک برنامه EPI و با نظر متخصصین اداره ایمنسازی، می توان ذخیره کرد و انتقال داد. واکسن منژیت را می توان حداقل به مدت ۲ سال، ذخیره نمود. در شرایط کار میدانی، به منظور پیشگیری از آلدگی، باید در انتهای روز، باقیمانده واکسن‌های آماده شده را به جای نگهداری در یخچال، دور ریخت.

یکی از مسائل مهم این است که در ابتدا باید محلی را برای ذخیره مقادیر مناسبی از واکسن، اختصاص داد. ویال واکسن حاوی ۵۰ دوز واکسن با حلال و پوشش آن به ۱۴۴ سانتیمتر مربع جا برای ذخیره‌سازی در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه، نیاز دارد.

۱۴- کمپروفیلاکسی

کمپروفیلاکسی (پیشگیری دارویی) در هنگام بروز اپیدمی، برای افرادی که با بیماران مننگوکوکی در یک محل زندگی می کنند، مناسب نیست. در مدت اپیدمی، تعداد زیادی از

مردم، در گروه افرادی که همراه مریض هستند، قرار می‌گیرند و به این دلایل، اقدام به کمپروفیلاکسی، ممکن است تأثیر خوبی نداشته باشد.

۴- پایش نحوه برخورد با اپیدمی

کمیته بحران می‌بایست در طول دوره مقابله با اپیدمی، بهطور منظم، تشکیل جلسه دهد. در این جلسات، موضوعات زیر باید بررسی شوند:

- انطباق بیماری با منطقه و گروه‌های سنی: آیا منطقه تحت تأثیر بیماری، گسترش جغرافیایی داشته است؟ آیا در مناطقی که تحت واکسیناسیون قرار گرفته اند، میزان ابتلاء کاهش یافته است؟ آیا گروه هدف سنی مورد نظر از بین مردم، مناسب انتخاب شده است؟
- انطباق مرگ و میر موارد با منطقه جغرافیایی: آیا چاره‌جویی‌های انجام شده مناسب بوده است یا آنکه به درمان دارویی اضافی نیاز است؟ زیاد بودن میزان مرگ و میر (بیش از ۲٪)، اشکالاتی در درمان موارد را نشان می‌دهد و نیازمند بازبینی سیستم درمان است.
- آنتی‌بیوتیکها و وسایل تزریق: آیا افزایش آنها لازم است؟
- کمکرسانی در زمینه واکسن: آیا به افزایش واکسن و وسایل تزریق نیاز می‌باشد؟
- نیازهای حمل و نقل: آیا ماشین‌ها و وسایل حمل و نقل کافی هستند؟ هنگامی پایان اپیدمی اعلام می‌گردد که میزان موارد هفتگی بیماری کاهش یابد تا حدی که به سطح عادی آندمیک برسد و حداقل یک ماه در این سطح، باقی بماند. انتهای اپیدمی باید به صورت رسمی اعلام شود در آن صورت می‌توان تمام عملیات اضطراری را پایان داد. در هر حال نظام مراقبت تقویت نشده پس از اپیدمی باید ادامه پیدا کند زیرا ممکن است اپیدمی به صورت افزایش بروز موارد بیماری مجددًا ظهور پیدا کرده و به مناطقی که قبلًا تحت تأثیر اپیدمی نبوده‌اند، نیز سرایت نماید.

به دنبال رویداد اپیدمی بهتر است ارزیابی‌های زیر صورت گیرد:

- کنترل و ارزیابی پوشش واکسیناسیون (در محلها و گروه‌های سنی مختلف)؛
- ارزیابی عملیات اضطراری مثل: درمان موارد، واکسیناسیون و مشکلات کمکرسانی؛
- ارزیابی اثر اپیدمی بر فعالیتهای سیستم بهداشتی و جامعه؛

- چنانچه موارد جدیدی در مناطق واکسینه شده بروز نماید، می توان مطالعه ای را در زمینه کارآیی واکسن انجام داد.

۵- مستندسازی اپیدمی^۱

پس از اپیدمی، باید گزارش مختصری برای استفاده مسئولین و کارکنان مراکز بهداشتی در مورد بیماری و عملیات اضطراری به منظور مقابله با آن (Feed back)، تهیه کرد و توسط ۱. Documentation of the epidemic

CDC برای سازمانهای جهانی همچون سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانهایی که از جهات مختلف به این مسئله می پردازند، ارسال گردد. این مسئله در زمینه آموزش و برنامه ریزی مناسبی که پاسخگوی مشکلات آینده باشد، بسیار مهم است به طوریکه اگر به بهترین شکل ممکن، پاسخ داده نشود، باید ارزیابی دقیقی از موانعی که سبب ایجاد اختلال در اجرای برنامه شده است انجام گیرد تا پاسخهای آینده، کارآتر باشند.

۶- پیشگیری در دوره های بین اپیدمی

۱-۶ جداسازی بیمار مننگوکوکی در شرایط غیر اپیدمیک

قرنطینه بیمار، بررسی ترشحات نازوفارنکس اطرافیان بیمار از نظر وجود مننگوکوک، تعطیلی مدارس یا مؤسسات تحت تأثیر بیماری و جلوگیری از حضور اطرافیان بیمار در مدرسه، ضرورتی ندارد و نباید ترویج شود . اگر مورد مننگوکوکی یافت شود، در صورت امکان (از نظر هزینه و موجود بودن دارو)، می توان کمپروفیلاکسی انجام داد اما باید تنها در مورد افرادی انجام شود که یا ارتباط بسیار نزدیکی با بیمار دارند یا اینکه با فرد بیمار، در یک ظرف غذا می خورند و در یک محل می خوابند. کارکنان بهداشتی حتی افرادی که در بیمارستان کار می کنند، چنانچه ارتباط تنگاتنگ (تنفس دهان به دهان) با بیمار نداشته باشند، در معرض خطر محسوب نمی گردند.

برای آنکه کمپروفیلاکسی، کارآ باشد باید به سرعت مورد استفاده قرار گیرد . کمپروفیلاکسی همگانی توصیه نمی شود و ادغام آن که در برنامه های روئین ایمنسازی عمومی، لازم نیست زیرا به اندازه هزینه و نیروی صرف شده مفید نخواهد بود.

در بین بعضی از گروه های در معرض خطر برای دوره های محدودی، می توان واکسیناسیون روتین را توصیه کرد. در جمهوری اسلامی ایران و بعضی کشورهای دیگر برای سربازان، حجاج و مسافرانی که به کشورهای آندمیک سفر می کنند، واکسیناسیون روتین انجام می شود و در این مورد از واکسن دو گانه پلی ساکارید C، A استفاده می شود (غیر از حجاج که برای آنها از واکسن ۴ گانه استفاده می شود). کارشناسانی که با نمونه های حاوی مننگوکوک کار می کنند نیز باید به شکل روتین، واکسینه شوند.

در صورت وجود واکسن های جدید Conjugate، در مناطقی که بیماری هیپر آندمیک است، می توان فرضیه واکسیناسیون روتین علیه مننگوکوک را مورد ملاحظه قرار داد . ممکنست این مسئله در ارتباط با اینمی ضد هموفیلوس آنفلوانزا نیز صادق باشد و این واکسن نیز در جدول واکسیناسیون همگانی درج شود.

از آنجاییکه پس از گذشت ۸ الی ۱۰ روز پس از واکسیناسیون، آنتی بادی های ایمن کننده در بدن ایجاد می شوند و همچنین خطر سرایت ثانویه در مدت یک هفته پس از تماس با بیمار، وجود دارد، کمپرووفیلاکسی یک راه اساسی برای جلوگیری از ایجاد موارد ثانویه بیماری مننگوکوکی در ابتلاء اسپورادیک محسوب می شود (واکسیناسیون چنین اثری را ندارد).

۴-۶ واکسیناسیون روتین

معمولًا واکسیناسیون روتین شیرخواران حتی در مناطقی که در معرض خطر بالای بروز اپیدمی قرار دارند به دلایل زیر توصیه نمی شود :

واکسنهای مننگوکوکی آماده در حال حاضر (پلی ساکاریدهای W_{۱۳۵}, Y, C, A) چنانچه به کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه داده شود، قدرت ایجاد اینمی طولانی مدت را ندارد (مخصوصاً سروگروپ C) و اگر در سه ماهگی واکسن تزریق شود، باید دوزهای دیگری نیز در ماه های بعد به او داده شود.

فایده اینگونه واکسیناسیون، جای سؤال دارد و با توجه به کارآیی محدود آن در اطفال، نمی توان واکسن پلی ساکاریدی مننگوکوکی را در جدول واکسیناسیون همگانی درج کرد.

۱۱۰-۶ توصیه به مسافران

به مسافرانی که بالای ۱۸ ماه سن دارند و قصد مسافرت به مناطق دارای اپیدمی مننگوکوکی یا مناطق دارای ریسک زیاد ابتلاء به بیماری مننگوکوکی آندمیک را دارند توصیه می شود که دوز واحدی از پلی ساکاریدهای C,A موسم حج ۱۹۸۷، سازمانهای سعودی از حجاج و افراد مسن خواستند که در هنگام بروز اپیدمی مننگوکوکی در عربستان، گواهی واکسینه شدن علیه مننگوکوک را نشان دهند.

شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کیفیت مراقبت منزّیت

بررسی کمی و کیفی اجرای برنامه در مراحل مختلف از طریق نظارت و پایش دقیق آن از سطوح زیر مجموعه، طبق برنامه زمانبندی شده، یکی از مهمترین اصول مراقبت است. انجام پایش و ارزشیابی به همراه تنظیم چک لیست برنامه، با توجه به موارد ذیل ضروری است:

۱. درصورتیکه کمتر از ۱۰٪ نتایج بررسی نمونه‌های CSF، دارای عامل باکتریایی باشد، لازم است بررسی‌های ذیل انجام گردد:

- توانایی همه آزمایشگاهها برای شناسایی هموفیلوس آنفلوانزا و سایر باکتریها؛
- معیارهای برداشت نمونه CSF (با توجه به علائم بالینی بیمار)؛
- نحوه استفاده از آنتی‌بیوتیک و نوع آن؛

- احتمال وجود اپیدمی سایر بیماریهای غیرباکتریال که ممکنست به افزایش انجام LP منجر شود مثل تب دانگ، مالاریا، لپتوسیروز و

۲. درصورتیکه کمتر از ۲۵٪ موارد تأیید شده منزّیت باکتریال، ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا باشد، بررسی موارد ذیل الزامی است:

- توانایی همه آزمایشگاهها برای شناسایی هموفیلوس آنفلوانزا و سایر گونه‌های باکتریایی؛
- احتمال یک پیشروی اپیدمیک عفونت منزّیتی یا سلی؛

۳. میزان بروز منزّیت باکتریال در کودکان کمتر از ۵ سال، در حدود ۲۰۰ مورد در هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر در شرایط بدون اپیدمی است.

۱۴. تعداد قابل قبول نمونه CSF برداشت شده، ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد برای هر ۱۰۰/۰۰۰ کودک زیر ۵ سال است (برآورده شود که بیش از ۱۰٪ آنها باکتریال باشد).

۱۵. حداقل از ۹۰٪ موارد محتمل در همه سنین باید نمونه CSF یا خون برای ارزیابی، گرفته شود.

۱۶. تعداد قابل قبول کشت خون، حداقل ۵ برابر کشت CSF در کلیه سنین است. (در جاهاییکه امکان انجام آن وجود دارد).

۱۷. درصد موارد محتمل که در آن باکتری پاتوژن در خون یا CSF قطعاً تشخیص داده شده است :

- در CSF با تعداد ۱۰ لکوسیت یا بیشتر در میلی لیتر مکعب بیش از ۲۵٪ باشد.

- در CSF با تعداد ۱۰۰ لکوسیت یا بیشتر در میلی لیتر مکعب بیش از ۴۰٪ باشد.

۱۸. درصد CSF با Hib جدا شده بیش از ۲۰٪ کل موارد CSF است.

برخی از معیارهای قابل اندازه‌گیری در زیر آورده شده است :

۱. میزان بروز موارد قطعی منتزیت باکتریال :

$\frac{\text{تعداد موارد کشت مایع نخاع مثبت گزارش شده در یک زمان معین}}{100} \times 100$

جمعیت وسط سال

۲. میزان کشنندگی :

$\frac{\text{تعداد موارد فوت از منتزیت با کشت مثبت در یک زمان معین}}{100} \times 100$

تعداد کل موارد تشخیص داده شده با کشت مثبت در همان زمان

۳. درصد کمپروفیلاکسی اطرافیان :

۱۰۰ \times تعداد کل اطرافیان فرد مبتلا که در یک زمان معین (به موقع) دارو دریافت نموده‌اند.

تعداد کل اطرافیان فرد مبتلا در همان زمان

۱۴. درصد افراد مظنون LP شده :

LP شده‌اند \times ۱۰۰ تعداد افراد مظنون که

کل افراد مظنون به منزّیت

۱۵. درصد موارد قطعی شده :

۱۰۰ \times تعداد موارد قطعی

موارد مظنون

۱۶. درصد منزّیت مننگوکوکی :

۱۰۰ \times تعداد موارد منزّیت مننگوکوکی

کل موارد قطعی شده باکتریال

۱۷. میزان بروز منزّیت مننگوکوکی :

۱۰۰/۰۰۰ \times تعداد موارد منزّیت مننگوکوکی

جمعیت وسط سال

۱۸. درصد موارد منزّیت هموفیلوس آنفلوانزا :

۱۰۰ \times تعداد موارد منزّیت هموفیلوس آنفلوانزا

کل موارد قطعی شده باکتریال

۱۹. میزان بروز منزّیت پنوموکوکی :

تعداد موارد منزهیت پنوموکوکی \times ۱۰۰/۰۰۰

جمعیت وسط سال

۱۰. میزان بروز منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا :

تعداد موارد منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا \times ۱۰۰/۰۰۰

جمعیت کودکان کمتر از ۵ سال

۱۱. میزان مرگ و میر منزهیت مننگوکوکی :

تعداد موارد مرگ از منزهیت مننگوکوکی \times ۱۰۰/۰۰۰

جمعیت وسط سال

۱۲. میزان مرگ و میر منزهیت پنوموکوکی :

تعداد موارد مرگ از منزهیت پنوموکوکی \times ۱۰۰/۰۰۰

جمعیت وسط سال

۱۳. میزان مرگ و میر منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا :

تعداد موارد مرگ از منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا \times ۱۰۰/۰۰۰

جمعیت وسط سال

۱۴. میزان کشنده‌گی منزهیت مننگوکوکی :

تعداد موارد مرگ از منزهیت مننگوکوکی \times ۱۰۰

تعداد موارد قطعی منزهیت مننگوکوکی

۱۵. میزان کشندگی منزهیت پنوموکوکی :

$$\frac{\text{تعداد موارد مرگ از منزهیت پنوموکوکی}}{\text{تعداد موارد قطعی منزهیت پنوموکوکی}} \times 100$$

۱۶. میزان کشندگی منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا :

$$\frac{\text{تعداد موارد مرگ منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا}}{\text{تعداد موارد قطعی منزهیت هموفیلوس آنفلوانزا}} \times 100$$

۱۷. درصد پزشکان عمومی آموزش دیده :

$$\frac{\text{تعداد پزشکان عمومی آموزش دیده در طول یک سال}}{\text{کل پزشکان عمومی در سطح کشور}} \times 100$$

۱۸. درصد پرسنل آزمایشگاهی آموزش دیده :

$$\frac{\text{تعداد پرسنل آزمایشگاهی آموزش دیده}}{\text{کل پرسنل آزمایشگاهی (مسئول انجام آزمایشات منزهیت)}} \times 100$$

۱۹. درصد آزمایشگاههای فعال

$$\frac{\text{تعداد آزمایشگاههای فعال در انجام آزمایشات منزهیت}}{\text{کل آزمایشگاههای موجود (در شهرستان و استان)}} \times 100$$

دستورالعمل تکمیل لیست خطی موارد مبتلا به منزیت (فرم شماره ۱)

این فرم در پایان هر ماه در مرکز بهداشت شهرستان براساس گزارشات رسیده در آن ماه از بیمارستانها و براساس گزارشات هفتگی ارسال شده (موجود در شهرستان) و همچنین مواردیکه تشخیص آنها در این ماه تأیید شده و یا به هر دلیل در ماه قبل ثبت نشد است؛ تکمیل شده و تا پنجم هر ماه به واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی هر دانشگاه ارسال می‌گردد.

۱. ردیف : به هر مورد مبتلا به منزیت، شماره ردیفی اختصاص می‌یابد و این شماره در هر ماه از ۱ شروع می‌شود.

۲. نام : ثبت نام و نام خانوادگی دقیق بیمار (شناسنامه‌ای) الزامی است، بدیهی است در غیر اینصورت پیگیری بیمار و خانواده وی با مشکل مواجه می‌شود و موارد تکراری نیز قابل تشخیص نخواهند بود.

۳. سن : در مورد شیرخواران کمتر از یک ماه به روز، در مورد کودکان زیر ۲ سال به ماه و در مورد کودکان بالای ۲ سال و بالغین به سال، ثبت گردد.

۴. جنس : شامل : زن، مرد، نامعلوم، بوده و در ستون مربوطه مشخص شود.

۵. شغل : محل اشتغال بیمار در زمان بیماری نوشته شود. بدیهی است با توجه به اهمیت زندگی در مراکز تجمعی نظیر خوابگاه یا محلهای نگهداری، باید به مواردی نظیر دانشجو، سرباز، محصل یا حضور در مهد کودک نیز اشاره گردد.

۶. تاریخ : اولین علائم بیماری، پذیرش در بیمارستان و انجام LP بیمار، به روز / ماه ثبت شود.

٧. علائم بالینی : علائمی که بیمار با آن مراجعه کرده، در صورت وجود با علامت (+) و در صورت عدم وجود با علامت (-)، نشان داده شود.

٨. تاریخ گزارش : تاریخ گزارش به استان و انجام LP، به روز / ماه ثبت گردد.
در صورتیکه LP انجام نشده است این ستون خالی گذاشته شود.

٩. مشخصات مربوط به مایع CSF / خون :

ظاهر نمونه : شامل کدر، شفاف یا خونی بودن نمونه باید در ستون مربوطه، نوشته شود.
شمارش سلول : در این ستون، درصد لنفوسيت و پلی مورفونوکلواژ (بهصورت عددی) نوشته شده و تعداد کل سلولها در ستون مربوطه ذکر گردد.

پروتئین و قند : بهصورت عددی و براساس میلی گرم در دسی لیتر، ثبت گردد.

کشت : درصورت انجام کشت در هر یک از نمونه های CSF یا خون، مثبت بودن نتیجه با علامت (+) منفی بودن نتیجه با علامت (-)، نشان داده شود و در صورتیکه کشت انجام نشده باشد، این ستون خالی گذاشته شود.

لاتکس : درصورت انجام شدن، نتیجه مثبت آن با علامت (+) و نتیجه منفی آن با علامت (-)، نشان داده شود و درصورتیکه انجام نشده باشد، این ستون خالی گذاشته شود.

(نوع جرم تشخیص داده شده در هر یک از آزمایشات فوق، در ستون نوع منزّیت مشخص خواهد گردید).

رنگ آمیزی گرم : درصورتیکه انجام شده و نتیجه آن، مثبت باشد با علامت (+) و اگر نتیجه آن منفی باشد با علامت (-) مشخص شود و در صورت عدم انجام رنگ آمیزی گرم، این ستون خالی گذاشته شود.

١٠. نوع منزّیت : منزّیت باکتریال، براساس تکنیک آزمایشگاهی انجام شده به تفکیک جرم و منزّیت ویرال، با توجه به علائم کلینیکی و نتیجه آزمایشات CSF یا خون، مشخص شده و با علامت (٧) در ستون مربوطه ثبت شود. سایر انواع منزّیت (قارچ، میکوباکتریوم توبرکلوزیس و)، در ستون سایر موارد، ثبت شود.

۱۱. آنتی بیوتیک: اگر قبل از انجام LP، آنتی بیوتیکی مصرف شده باشد، با علامت (۷) نشان داده شود و بعد از تشخیص، نوع آنتی بیوتیک دریافتی براساس کد ثبت شده در ذیل فرم خلاصه اطلاعات، نوشته شود.

۱۲. پیامد: نتیجه سیر بیماری اعم از زنده ماندن، بهبودی و یا فوت بیمار، ثبت گردد . در صورت عدم وجود اطلاعات، علیرغم پیگیری انجام شده، در ستون نامعلوم با علامت (۷) مشخص گردد.

۱۳. واکسیناسیون: در صورتیکه بیمار سابقه انجام واکسیناسیون Hib یا N.m را دارد و این موضوع به وسیله بیان بیمار و حافظه وی یا ثبت در کارت واکسیناسیون با تاریخ، اثبات شده باشد، در ستون مربوطه با علامت (۷)، مشخص شود و در صورتیکه واکسینه نشده است، هیچگونه علامتی در این ستون درج نشود.

۱۴. آدرس: شامل: نام شهر و روستا / خیابان یا محله و پلاک محل سکونت است که در پشت صفحه، نوشته می شود. بدیهی است در صورتی که بیمار سریاز، دانشجو و ... باشد، لازم است آدرس محل اقامت وی در زمان بیماری نیز ثبت گردد.

۱۵. ملاحظات: هر گونه اطلاعات در مورد بیمار که لازم است توضیح داده شود (اعم از انتقال به شهر یا استان دیگر و)، در این قسمت در پشت صفحه ثبت گردد.

دستورالعمل تکمیل فرم خلاصه اطلاعات بیماران مبتلا به منزیت (فرم شماره ۲)

این فرم در پایان هر ماه در مرکز بهداشت استان براساس گزارشات رسیده از مراکز بهداشت شهرستانها در آن ماه، پس از کنترل، پیگیری و تصحیح داده ها تکمیل شده و تا تاریخ پانزدهم ماه بعد به مرکز مدیریت بیماریها ارسال می گردد. لازم است در صحت تکمیل این فرم دقت نظر لازم اعمال گردد.

۱. ردیف : به هر مورد مبتلا به منزیت، شماره ردیفی اختصاص می یابد و این شماره در هر ماه از ۱ شروع می شود.

۲. نام : ثبت نام و نام خانوادگی دقیق بیمار (شناسنامه ای) الزامی است، بدیهی است در غیر اینصورت پیگیری بیمار و خانواده وی با مشکل، مواجه می شود و موارد تکراری نیز قابل تشخیص نخواهند بود.

۳. سن : در مورد شیرخواران کمتر از یک ماه به روز، در مورد کودکان زیر ۲ سال به ماه و در مورد کودکان بالای ۲ سال و بالغین به سال، ثبت گردد.

۴. جنس : شامل : زن، مرد، نامعلوم بوده و در ستون مربوطه مشخص شود.

۵. شغل : محل اشتغال بیمار در زمان بیماری نوشته شود. بدیهی است با توجه به اهمیت زندگی در مراکز تجمعی نظیر خوابگاه یا محلهای نگهداری، باید به مواردی نظیر دانشجو، سرباز، محصل یا نگهداری در مهد کودک نیز اشاره گردد.

۶. تاریخ : اولین علائم بیماری، پذیرش در بیمارستان و انجام LP بیمار، به روز / ماه ثبت شود.

۷. مشخصات مربوط به مایع CSF / خون :

ظاهر نمونه : شامل کدر، شفاف یا خونی بودن نمونه باید در ستون مربوطه، نوشته شود.

شمارش سلول : در این ستون، درصد لنفوسيت و پلی مورفونوكلوئر (بهصورت عددی) نوشته می شود و درصورتیکه diff نشده باشد، تعداد کل سلولها نوشته شود.

پروتئین و قند : بهصورت عددی و براساس میلیگرم در دسی لیتر، ثبت گردد.

کشت : درصورت انجام کشت در هر یک از نمونه های CSF یا خون، مثبت بودن نتیجه با علامت (+) منفی بودن نتیجه با علامت (-)، نشان داده شود و درصورتیکه کشت انجام نشده باشد، این ستون خالی نگهداشته شود.

لاتکس : درصورت انجام شدن، نتیجه مثبت آن با علامت (+) و نتیجه منفی آن با علامت (-)، نشان داده شود و درصورتیکه انجام نشده باشد، این ستون خالی گذاشته شود. (نوع جرم تشخیص داده شده در هر یک از آزمایشات فوق، در ستون نوع منژیت مشخص خواهد گردید).

رنگ، آمیزی گرم درصورتیکه انجام شده و نتیجه آن، مثبت باشد با علامت (+) و اگر نتیجه آن منفی باشد با علامت (-) مشخص شود و در صورت عدم انجام رنگ آمیزی گرم، این ستون خالی نگهداشته شود.

۸. نوع منژیت : منژیت باکتریال، براساس تکنیک آزمایشگاهی انجام شده به تفکیک جرم و منژیت ویرال، با توجه به علائم کلینیکی و نتیجه آزمایشات CSF یا خون، مشخص می گردد و با علامت (✓) در ستون مربوطه ثبت می شود. سایر انواع منژیت (قارچ، میکروبакتریوم توپر کلوزیس و)، در ستون سایر موارد، ثبت شود.

۹. آنتی بیوتیک: اگر قبل از انجام LP، آنتی بیوتیکی مصرف شده باشد، با علامت (✓) نشان داده شود و بعد از تشخیص نیز، نوع آنتی بیوتیک دریافتی براساس کد ثبت شده در ذیل فرم خلاصه اطلاعات، نوشته شود.

۱۰. پیامد: نتیجه سیر بیماری (زنده ماندن و بهبودی و یا فوت بیمار)، ثبت گردد. در صورت عدم وجود اطلاعات، علیرغم پیگیری انجام شده، در ستون نامعلوم با علامت (✓) مشخص گردد.

۱۱. واکسیناسیون : درصورتیکه بیمار سابقه انجام واکسیناسیون Hib یا N.m را دارد و این موضوع یا با بیان بیمار و حافظه وی یا ثبت در کارت واکسیناسیون با تاریخ، اثبات شده باشد، در ستون مربوطه با علامت (✓)، مشخص شود و درصورتیکه واکسینه نشده است، هیچگونه علامتی در این ستون درج نشود.

۱۲. آدرس : شامل: نام شهر یا روستا می باشد.

دستورالعمل تکمیل لیست خطی گزارش تلفنی موارد مظنون بیماری منزهیت (فرم شماره ۳)

این فرم بصورت روزانه در سطح شهرستان تکمیل شده و گزارش هر مورد به ستاد پیگیری بیماریها در استان بصورت تلفنی اعلام می گردد. در پایان هر روز نیز گزارشات مربوط به هر استان / دانشگاه به ستاد پیگیری مرکز مدیریت بیماریها اعلام می گردد. لازم است در هر مورد گزارش شده پیگیری دقیق و کام ل از نظر ثبت اطلاعات بمنظور انجام اقدام لازم در سطح شهرستان و سطوح بالاتر صورت گرفته و داده های گزارش شده در مورد بیماریها تصحیح و تکمیل گردد.

۱. ردیف : به هر مورد مبتلا یا مظنون به منزهیت شماره ردیفی اختصاص می یابد و این شماره در هر روز از ۱ شروع می شود.

۲. نام : ثبت نام و نام خانوادگی دقیق بیمار (شناسنامه‌ای) الزامی است، بدیهی است در غیر این صورت پیگیری بیمار و خانواده وی با مشکل، مواجه می شود و موارد تکراری نیز قابل تشخیص نخواهند بود.

۱۱. سن : در مورد شیرخواران کمتر از یک ماه به روز، در مورد کودکان زیر ۲ سال به ماه و در مورد کودکان بالای ۲ سال و بالغین به سال، باید ثبت گردد.

۱۲. جنس : شامل : زن، مرد، نامعلوم بوده و در ستون مربوطه مشخص شود

۱۳. شغل : محل اشتغال بیمار در زمان بیماری نوشته شود. بدیهی است با توجه به اهمیت زندگی در مراکز تجمعی نظیر خوابگاه یا محلهای نگهداری باید به مواردی نظری دانشجو، سرباز، محصل یا حضور در مهد کودک نیز اشاره گردد.

۱۴. تاریخ : اولین علائم بیماری، گزارش به ستاد پیگیری شهرستان استان یا مرکز مدیریت بیماریها، به روز، ماه ثبت گردد. بدیهی است در صورتیکه این فرم در سطح شهرستان تکمیل می‌گردد. تاریخ گزارش به شهرستان و در صورت تکمیل شدن در ستاد استان یا مرکزی تاریخ گزارش به استان یا مرکز مدیریت بیماریها ثبت گردد.

۱۵. انجام LP : اگر در زمان گرفتن گزارش LP انجام شده است با علامت (✓) در قسمت بلی مشخص گردد.

۱۶. مظنون به منزیت مننگوکوکی : در صورتیکه بر اساس علائم بالینی مثل وجود پتشی، پورپوراء، شوک، کاهش فشار خون، پیشرفت سریع بیماری، بدی حال عمومی و یا یافته‌های آزمایشگاهی (در صورت انجام آزمایشات مربوطه) شک به منزیت مننگوکوکی وجود دارد، در ستون بلی با علامت (✓) مشخص گردد.

۱۷. پیامد : نتیجه سیر بیماری (در حال درمان یا فوت یا نامعلوم بودن) در ستونهای مربوط با علامت (✓) مشخص گردد.

۱۸. آدرس: شامل: نام شهر و روستا / خیابان یا محله و پلاک محل سکونت است بدیهی است در صورتی که بیمار سرباز، دانشجو، محصل یا در مهد کودک و ... باشد، لازم است آدرس محل اقامت وی در زمان بیماری نیز ثبت گردد.

منابع :

١.Mandell,Douglas and Bennett – Principles and Practice of Infectious Diseases - Fifth Edition – ٢٠٠٩

٢.R.E.Behrman - R.M.Kliegman – H.B.Jenson- Nelson Text book of Pediatrics – ١٧th Edition – ٢٠٠٤

٣.World Health Organization - Bacterial Meningitis surveillance in the EMR –Second Draft – May – ٢٠٠٤

٤.World Health Organization - Control Of epidemic Meningococcal disease. WHO practical guidelines. ٢nd edition - EMC/BAC/٦٨.٣

٥.World Health Organization - Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis CDS /CSR /EDC/٩٩.٧

٦.World Health Organization - Vaccines and Biologicals Haemophilus Influenza typeb - V&B /٠٢.١٨